Aide au diagnostic en médecine générale

Examens et algorithmes décisionnels

Aide au diagnostic en médecine générale

Examens et algorithmes décisionnels

Fred F. Ferri, MD, FACP

Traduction et adaptation :

Pr. Jacques Wagner-Ballon

ELSEVIER
MASSON

Fred F. Ferri, MD, FACP, Clinical Professor, Apert Medical School, Brown University, Providence Rhode Island, États-Unis d'Amérique

Adaptation et traduction :

Jacques Wagner-Ballon, médecin généraliste, Professeur Associé de médecine générale à la Faculté de Médecine de Tours, France

L'éditeur ne pourra être tenu pour responsable de tout incident ou accident, tant aux personnes qu'aux biens, qui pourrait résulter soit de sa négligence, soit de l'utilisation de tous produits, méthodes, instructions ou idées décrits dans la publication. En raison de l'évolution rapide de la science médicale, l'éditeur recommande qu'une vérification extérieure intervienne pour les diagnostics et la posologie.

Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. 01 44 07 47 70.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

L'édition originale, *Ferri's Best Test*, second edition (ISBN 978-0-323-05759-2), a été publiée par Mosby, Inc., une filiale d'Elsevier Inc.

L'édition française, *Aide au diagnostic en médecine générale*, est une traduction adaptée de la Section III de *Ferri's Best Test*.

© 2010, 2004 by Mosby, Inc. an affiliate of Elsevier Inc.

© 2012, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés pour la traduction française
ISBN : 978-2-294-72126-7

Elsevier Masson SAS, 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex
www.elsevier-masson.fr

Note de l'éditeur

Cet ouvrage est une adaptation du livre *Ferri's Best Test*, qui reprend la Section III de l'ouvrage original. Il présente, pour 231 maladies ou symptômes communs, les modalités diagnostiques (imagerie et tests de laboratoire) suivies d'algorithmes d'aide au diagnostic.

Préface de l'édition originale

L'auteur espère que cette approche aidera à s'y retrouver dans le labyrinthe des examens diagnostiques disponibles et amènera les lecteurs de ce manuel à choisir les plus pertinents en complément de leurs connaissances cliniques.

Il est cependant très important de souligner que les examens de laboratoire et l'imagerie médicale seuls ne peuvent fournir un diagnostic ; seul un médecin peut le faire, après avoir intégré les résultats de ces outils dans son évaluation clinique globale.

Fred F. Ferri, MD, FACP

Clinical Professor

Alpert Medical School

Brown University

Providence, Rhode Island, États-Unis d'Amérique

Préface de l'édition française

L'expertise clinique du praticien, aussi précise soit-elle, a besoin d'être étayée par l'apport de la biologie et de l'imagerie.

Avec le pragmatisme coutumier anglo-saxon, notre collègue F. Ferri nous propose un choix de judicieux algorithmes qui permettront de finaliser rapidement le diagnostic en choisissant les examens les plus pertinents de manière très visuelle.

Jacques Wagner-Ballon

Professeur Associé de médecine générale

Note de l'éditeur

Cet ouvrage est une adaptation du livre *Ferri's Best Test*, qui reprend la Section III de l'ouvrage original. Il présente, pour 231 maladies ou symptômes communs, les modalités diagnostiques (imagerie et tests de laboratoire) suivies d'algorithmes d'aide au diagnostic.

Préface de l'édition originale

L'auteur espère que cette approche aidera à s'y retrouver dans le labyrinthe des examens diagnostiques disponibles et amènera les lecteurs de ce manuel à choisir les plus pertinents en complément de leurs connaissances cliniques.

Il est cependant très important de souligner que les examens de laboratoire et l'imagerie médicale seuls ne peuvent fournir un diagnostic ; seul un médecin peut le faire, après avoir intégré les résultats de ces outils dans son évaluation clinique globale.

Fred F. Ferri, MD, FACP

Clinical Professor

Alpert Medical School

Brown University

Providence, Rhode Island, États-Unis d'Amérique

Préface de l'édition française

L'expertise clinique du praticien, aussi précise soit-elle, a besoin d'être étayée par l'apport de la biologie et de l'imagerie.

Avec le pragmatisme coutumier anglo-saxon, notre collègue F. Ferri nous propose un choix de judicieux algorithmes qui permettront de finaliser rapidement le diagnostic en choisissant les examens les plus pertinents de manière très visuelle.

Jacques Wagner-Ballon

Professeur Associé de médecine générale

Note de l'éditeur

Cet ouvrage est une adaptation du livre *Ferri's Best Test*, qui reprend la Section III de l'ouvrage original. Il présente, pour 231 maladies ou symptômes communs, les modalités diagnostiques (imagerie et tests de laboratoire) suivies d'algorithmes d'aide au diagnostic.

Préface de l'édition originale

L'auteur espère que cette approche aidera à s'y retrouver dans le labyrinthe des examens diagnostiques disponibles et amènera les lecteurs de ce manuel à choisir les plus pertinents en complément de leurs connaissances cliniques.

Il est cependant très important de souligner que les examens de laboratoire et l'imagerie médicale seuls ne peuvent fournir un diagnostic ; seul un médecin peut le faire, après avoir intégré les résultats de ces outils dans son évaluation clinique globale.

Fred F. Ferri, MD, FACP

Clinical Professor

Alpert Medical School

Brown University

Providence, Rhode Island, États-Unis d'Amérique

Préface de l'édition française

L'expertise clinique du praticien, aussi précise soit-elle, a besoin d'être étayée par l'apport de la biologie et de l'imagerie.

Avec le pragmatisme coutumier anglo-saxon, notre collègue F. Ferri nous propose un choix de judicieux algorithmes qui permettront de finaliser rapidement le diagnostic en choisissant les examens les plus pertinents de manière très visuelle.

Jacques Wagner-Ballon

Professeur Associé de médecine générale

Remerciements de l'édition originale

L'auteur remercie les auteurs et contributeurs des titres référencés ci-dessous pour leur aimable autorisation de reproduire des images, autres illustrations et textes dans cet ouvrage.

Grainger RG, Allison D: *Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, a Textbook of Medical Imaging*, ed 4, Philadelphia: Churchill Livingstone, 2001

Mettler FA: *Primary Care Radiology*, Philadelphia, WB Saunders, 2000

Pagana KD, Pagana TJ: *Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference*, ed 8, St. Louis, Mosby, 2007

Talley NJ, Martin CJ: *Clinical Gastroenterology*, ed 2, Sidney, Churchill Livingstone, 2006

Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW: *Primer of Diagnostic Imaging*, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007

Wu AHB: *Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests*, Philadelphia, WB Saunders, 2006

Fred F. Ferri, MD, FACP

Liste des abréviations

AAN	anticorps antinucléaire
AINS	anti-inflammatoires non stéroïdiens
AIT	accident ischémique transitoire
AMC	anticorps antimitochondrie
ANCA	<i>antineutrophilic cytoplasmic antibody</i> (anticorps anticytoplasme des polynucléaires)
AOMI	artérite oblitérante des membres inférieurs
ARM	angiographie-IRM
ATM	articulation temporomandibulaire
AVC	accident cérébrovasculaire
BNP	<i>B-type natriuretic peptide</i>
BPCO	bronchopneumopathie chronique obstructive
CIVD	coagulation intravasculaire disséminée
CM	connectivite mixte
CMV	cytomégalovirus
CPK	créatine-phosphokinase
CPRE	cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique
CPRM	cholangiopancréatographie par résonance magnétique
CRP	<i>C-reactive protein</i> (protéine C réactive)
DHEAS	sulfate de déhydroépiandrostérone
DXA	<i>dual energy X-ray absorptiometry</i> (absorptiométrie biphotonique à rayons X)
EBV	virus d'Epstein-Barr
ECA	enzyme de conversion de l'angiotensine
ECG	électrocardiogramme
EEG	électro-encéphalogramme
EFR	épreuves fonctionnelles respiratoires
ELISA	Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
EMG	électromyogramme
ETO	échocardiographie transœsophagienne
FE	fraction d'éjection
GB	globule blanc
GnRH	<i>gonadotrophin releasing hormone</i> (gonadolibérine)
GR	globule rouge
Hb	hémoglobine
HBP	hypertrophie bénigne de la prostate
Hmt	hématocrite
HPV	<i>human papillomavirus</i> (papillomavirus humain)
IEC	inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
Ig	immunoglobuline
IM	infarctus du myocarde
INR	<i>international normalized ratio</i>
IPP	inhibiteur de la pompe à protons
IPS	indice de pression systolique cheville/bras
IRM	imagerie par résonance magnétique
IV	intraveineux(se)
IVG	insuffisance ventriculaire gauche
LCR	liquide céphalorachidien
LDH	lacticodéshydrogénase
LED	lupus érythémateux disséminé
LGV	lymphogranulome vénérien
MMSE	Mini Mental State Examination
MNI	mononucléose infectieuse
NFS	numération formule sanguine
PA	postéroantérieur

PCR	<i>polymerase chain reaction</i>
PL	ponction lombaire
PR	polyarthrite rhumatoïde
PSA	<i>prostate-specific antigen</i>
PTH	parathormone
PTI	purpura thrombopénique idiopathique
PTT	purpura thrombotique thrombocytopénique
RIBA	<i>recombinant immunoblot assay</i>
SDRA	syndrome de détresse respiratoire aiguë
SDRC	syndrome douloureux régional complexe
SHU	syndrome hémolytique urémique
SIADH	syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique
SLA	sclérose latérale amyotrophique
SNC	système nerveux central
TA	trou anionique
TCA	temps de céphaline activée
TCT	test cutané tuberculinique
TDM	tomodensitométrie
TEP	tomographie par émission de positons
TFH	tests fonctionnels hépatiques
TNM	tumeur, ganglion lymphatique (<i>node</i>), métastases
TP	temps de prothrombine
TSH	<i>thyroid stimulating hormone</i> (thyroestimuline)
TT	temps de thrombine
TVP	thrombose veineuse profonde
VCS	veine cave supérieure
VDRL	Venereal Disease Research Laboratory
VGM	volume globulaire moyen
VHA	virus de l'hépatite A
VHB	virus de l'hépatite B
VHC	virus de l'hépatite C
VHS	virus herpès simplex
VP	ventilation/perfusion
VS	vitesse de sédimentation

Maladies et syndromes

Ce livre propose les algorithmes des examens paracliniques (imagerie et biologie) utiles au diagnostic des 231 maladies ou syndromes suivants. Avant tout bilan complémentaire, l'anamnèse et l'examen clinique du patient sont indispensables.

Les algorithmes fournissent une assistance au clinicien dans l'évaluation et le traitement des patients. Ils ne sont d'aucune utilité chez les patients ayant une maladie ou un syndrome particulier et n'ont pas vocation à remplacer le jugement personnel du clinicien.

Il importe de prendre en compte que les conclusions propres à l'anamnèse et à l'examen clinique d'un patient peuvent tout à fait être autres que celles suggérées par les examens complémentaires.

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- IRM du cerveau avec injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- TDM avec injection IV de produit de contraste si l'IRM est contre-indiquée
- Échocardiographie si une endocardite est suspectée d'être à l'origine de l'embolie cérébrale septique

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- NFS

Examens complémentaires

- Hémocultures (10 % positives)
- VS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun ; l'imagerie n'est en général pas indiquée, sauf en cas d'abcès profond

Examens complémentaires

- TDM pelvienne avec injection IV de produit de contraste
- Échographie endoscopique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Cytobactériologie, mise en culture (aérobie et anaérobie) et antibiogramme du prélèvement de l'abcès

Examens complémentaires

- NFS.
- Hémocultures × 2

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM du foie avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- Échographie du foie si TDM contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Cytobactériologie, culture et antibiogramme du produit de l'aspiration éventuelle de l'abcès

Examens complémentaires

- Transaminases (augmentées dans 50 % des cas)
- Phosphatase alcaline sérique (augmentée dans 95 % des cas)
- Coprocultures à la recherche des trophozoïtes d'*Entamoeba histolytica*
- Anticorps sérique d'*E. histolytica*

Algorithme diagnostique

Figure 1 Abscès du foie. La coupe au niveau de la veine portale de la TDM montre de multiples lésions de faible intensité avec un contour plus soutenu (*pointes de flèches*). Cet aspect n'est pas spécifique et souvent coïncide avec celui de métastases. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM thoracique avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique qui peut révéler une lésion cavitaire avec niveau hydroaérique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Cytobactériologie, culture et antibiogramme du produit de l'aspiration de l'abcès obtenu par bronchoscopie

Examens complémentaires

- NFS
- Hémogramme
- Hémocultures × 2
- Cytobactériologie, culture et antibiogramme des crachats (faible rendement)

Algorithme diagnostique

Figure 2 Abscès pulmonaire montrant un niveau hydroaérique. (Source : Cohen J, Powderly WG : Infectious Diseases, ed 2, St Louis, Mosby, 2004.)

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Échographie du sein

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Examen cytbactériologique et mise en culture du pus

Examens complémentaires

- Hémogramme
- Hémoculture

Algorithme diagnostique

6. Abscesses épidurales

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- IRM avec injection de gadolinium dans la moelle épinière

Examens complémentaires

- Myélographie sous TDM (plus sensible en cas de compression de la moelle épinière)

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Cytobactériologie, cultures et antibiogramme sur le prélèvement de l'abcès

Examens complémentaires

- NFS
- Hémocultures × 2
- VS

Algorithme diagnostique

7. Abscès intra-abdominal

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- L'échographie de l'abdomen est utile chez les jeunes femmes et les enfants

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Cytobactériologie, culture et antibiogramme du prélèvement de l'abcès

Examens complémentaires

- NFS
- Hémocultures × 2
- Transaminases
- Azotémie, créatininémie, glycémie

Algorithme diagnostique

8. Abscès pelvien

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- TDM pelvienne avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- Échographie pelvienne si TDM contre-indiquée

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Cytobactériologie, culture et antibiogramme du prélèvement de l'abcès

Examens complémentaires

- NFS
- Cytobactériologie, cultures aéro- et anaérobie des prélèvements du col de l'utérus, du sang et de la cavité péritonéale (si ponctionnée)
- ECBU, culture et antibiogramme
- Test de grossesse chez la femme en âge de procréer

Algorithme diagnostique

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- TDM des tissus mous du cou avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- Radiographie latérale des tissus mous du cou (souvent recherche initiale)
- IRM du cou

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Prélèvement de la gorge pour cyto bactériologie, mise en culture et antibiogramme
- Hémoculture × 2

Algorithme diagnostique

10. Accident ischémique transitoire (AIT)

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Écho-Doppler carotidien (pour visualiser la sténose)

Examens complémentaires

- TDM de la tête sans injection de produit de contraste pour exclure une hémorragie ou un hématome sous-dural
- Échocardiographie si une origine cardiaque est suspectée
- ARM cérébrale si une ischémie de la circulation postérieure est suspectée

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- TP, TCA, nombre de plaquettes
- Bilan lipidique, glycémie
- VS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM cérébrale sans injection de produit de contraste initialement ; à répéter ultérieurement avec injection de produit de contraste
- L'IRM cérébrale peut être utilisée au lieu de la TDM

Examens complémentaires

- Écho-Doppler carotidien
- Échocardiogramme

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TP, TCA, numération plaquettaire
- Bilan lipidique, glycémie
- Transaminases, ionogramme sanguin, azotémie, créatininémie
- NFS

Algorithme diagnostique

Figure 3 Infarctus ischémique aigu dans le territoire de l'artère cérébrale gauche. TDM datant de moins de 24 h après le début de l'AVC montrant une diminution de la différenciation entre matière grise et blanche et un obscurcissement des noyaux caudaux et lenticulaires. Il y a un effacement des sillons frontaux gauches. À 48 h, l'infarctus était bien constitué et offrait un aspect plus massif.

(Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Manométrie œsophagienne*

Examens complémentaires

- Transit baryté sous radioscopie
- Fibroscopie gastro-œsophagienne

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Dosage de l'albuminémie pour bilan nutritionnel

- L'édition originale préconise le transit baryté en premier examen. La Société nationale française de gastro-entérologie précise que l'examen manométrique est le gold standard et non le transit baryté. (NdT)

Algorithme diagnostique

Figure 4 Achalasie. JOG : jonction gastro-œsophagienne. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme sanguin
- Gaz du sang

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie, glycémie
- Calcul du trou anionique (TA) = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme
- Gaz du sang

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie

Algorithme diagnostique

15. Acouphènes

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Doppler carotidien
- IRM cérébrale et des conduits auditifs
- ARM cérébrale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Bilan lipidique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM avec injection de produit de contraste de l'hypophyse et de l'hypothalamus

Examens complémentaires

- TDM si IRM contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage radio-immunologique des taux plasmatiques d'hormone de croissance IGF-1 (*insulin-like growth factor 1*)

Examens complémentaires

- Épreuve de freinage de la sécrétion de l'hormone de croissance après surcharge en glucose
- Phosphatémie (augmentée)
- Calcémie (augmentée)

Algorithme diagnostique

17. Actinomycose

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique

Examens complémentaires

- TDM de la tête, du poumon, de l'abdomen et du pelvis

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Isolement des « granulations jaune soufre » (contenant l'*Actinomyces*) issues des fistulisations ou de la biopsie cutanée

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'hypophyse avec injection de gadolinium

Examens complémentaires

- TDM de l'hypophyse si l'IRM est contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Bilan d'excès ou de déficit hormonal suivant la clinique (par ex. taux de prolactinémie, IGF-1, T₄ libre, test de frénation à la dexaméthasone)

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Tumeur hypophysaire avec extension suprasellaire

Figure 5 IRM montrant une tumeur volumineuse de l'hypophyse avec extension suprasellaire provoquant une acromégalie. (D'après Besser CM, Thorner MO : Comprehensive Clinical Endocrinology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2002.)

Figure 6 Classification radiologique des adénomes de l'hypophyse. Les tumeurs hypophysaires sont communément classées selon leur taille, leur statut invasif, leur potentiel de croissance, comme l'ont proposé Hardy et Vezina en 1979. Les tumeurs inférieures ou égales à 1 cm de diamètre sont appelées microadénomes, alors que les plus grosses sont appelées macroadénomes. Grade 0 : microadénome intrahypophysaire ; selle turcique d'apparence normale. Grade 1 : microadénome intrahypophysaire ; bombement de la paroi turcique. Grade 2 : macroadénome intrahypophysaire ; selle turcique élargie globalement ; pas d'invasion. Grade 3 : macroadénome ; selle turcique envahie localement et/ou détruite. Grade 4 : macroadénome ; selle turcique envahie globalement et/ou détruite. Les tumeurs sont classées de plus sur la base de leur extension sellaire, soit supra-, soit parasellaire. (D'après Besser CM, Thorner MO : *Comprehensive Clinical Endocrinology*, ed 3, St. Louis, Mosby, 2002.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM du thorax avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie du ganglion lymphatique

Examens complémentaires

- NFS
- VS (non spécifique)
- Transaminases
- Tests tuberculiques
- Taux d'ECA

Algorithme diagnostique

Figure 7 Tumeurs médiastinales d'un lymphome. TDM avec injection de produit de contraste montrant une grosse tumeur antérieure chez un jeune patient atteint d'un Hodgkin. Aucune autre maladie n'a été trouvée. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphie, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme sanguin
- Gaz du sang

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie
- Taux de chlore urinaire

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme
- Gaz du sang

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- IRM avec injection de produit de contraste ou TDM des surrénales avec injection de produit de contraste pour localiser un cancer
- Scintigraphie des surrénales avec l'iodocholestérol (NP-59) ou avec le 6-béta-iodométhyl-19-norcholestérol

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Taux d'aldostérone (TA)
- Taux d'activité de la rénine plasmatique (ARP)

Examens complémentaires

- Ionogramme sanguin
- Test de freination de l'aldostérone

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'hypophyse, de l'hypothalamus avec opacification au gadolinium quand une lésion hypophysaire ou hypothalamique est suspectée

Examens complémentaires

- Échographie pelvienne

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- FSH
- Prolactinémie
- TSH

Examens complémentaires

- β -HCG

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'hypophyse, de l'hypothalamus avec opacification au gadolinium quand une lésion hypophysaire ou hypothalamique est suspectée

Examens complémentaires

- Échographie pelvienne
- TDM ou IRM des surrénales

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- β -HCG
- Prolactinémie
- FSH

Examens complémentaires

- LH
- Testostérone
- DHEAS
- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM du foie avec injection de produit de contraste si suspicion d'abcès

Examens complémentaires

- Échographie du foie si la TDM n'est pas disponible

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Examen des selles à la recherche de kystes et/ou de trophozoïtes

Examens complémentaires

- Tests sérologiques d'anticorps spécifiques d'*Entamoeba histolytica*

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- Échocardiographie
- Scintigraphie isotopique de l'AP (composant amyloïde pentagonal)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie rectale (positive dans plus de 60 % des cas) révélant les dépôts amyloïdes tissulaires
- Aspiration de la graisse sous-cutanée et coloration au rouge Congo et examen en lumière polarisée pour mettre en évidence la biréfringence caractéristique

Examens complémentaires

- Immunoélectrophorèse du plasma et des urines
- Hémogramme, TSH, créatininémie, transaminases
- ECBU

Algorithme diagnostique

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Taux de réticulocytes

Examens complémentaires

- Taux de B₁₂, d'acide folique
- GGT, transaminases
- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Taux de réticulocytes
- Examen de selles × 3 pour éliminer un saignement occulte

Examens complémentaires

- Ferritinémie
- Sidérémie, transferrine, coefficient de saturation
- Électrophorèse de l'hémoglobine
- Plombémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- L'écho-Doppler est l'examen discriminant de choix ; la TDM est plus précise

Examens complémentaires

- TDM de l'aorte abdominale avec injection de produit de contraste pour le bilan préopératoire (estimation de la taille et du risque de fissuration/rupture)
- Aortographie pour bilan artériel avant l'opération

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TP, TCA

Examens complémentaires

- Taux de plaquettes
- Temps de rétraction du caillot
- Temps de thrombine (TT)
- Titration des facteurs VIII, IX, de la fonction plaquettaire, de la durée de vie des plaquettes
- Taux de fibrinogène
- Facteurs II, V, X, XIII

Algorithme diagnostique

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Échantillonnage des AAN

Examens complémentaires

- Anti-Ds
- Ac anti-ADN
- Ac Anti-Smith
- Ac Anti-RNP
- Anti-SS-A, Anti-SS-B
- NFS
- VS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM de la région appendiculaire avec produit de contraste IV et per os

Examens complémentaires

- Échographie du pelvis réalisée à la place de la TDM chez les enfants et/ou les femmes en âge de procréer quand la TDM n'est pas possible ou contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS
- ECBU

Examens complémentaires

- Test de grossesse chez la femme en âge de procréer

Algorithme diagnostique

Figure 8 Appendicite. **A.** L'échographie montre une structure tubulaire fermée hypoéchogène empâtée dans la fosse iliaque droite. La graisse autour est hyperéchogène. **B.** La TDM montre l'appendice enflammé et épaissi (flèche). (Remerciements au Dr A McLean, St. Bartholomew's Hospital London. Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphie, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Doppler continu pour mesurer la pression systolique artérielle et l'indice de pression systolique cheville/bras (IPS)

Examens complémentaires

- Écho-Doppler (utile pour localiser la zone oblitérée et évaluer l'atteinte des artères distales)
- Artériographie (si une intervention chirurgicale est envisagée par angioplastie ou pose d'un stent)

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Glycémie à jeun
- Bilan lipidique
- Créatininémie

Algorithme diagnostique

34. Artérite temporele (à cellules géantes)

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique et échographie de l'aorte abdominale si artérite temporele (augmente le risque d'anévrisme)
- Artériographie de l'artère temporele (positive si elle révèle un halo sombre provoqué par l'œdème de la paroi artérielle)

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Biopsie de l'artère temporele
- VS

Examens complémentaires

- NFS, transaminases, phosphatase alcaline

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- La radiographie standard de l'articulation touchée pour trouver ou éliminer fracture, cancer, destruction de l'os adjacent est le meilleur examen

Examens complémentaires

- TDM avec injection de produit de contraste pour un diagnostic précoce, en cas de suspicion d'infection du rachis, des hanches ou des articulations sternoclaviculaires ou sacro-iliaques

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ponction articulaire avec examen cytbactériologique du liquide synovial, mise en culture et antibiogramme (recherche de gonocoque si la clinique y fait penser)

Examens complémentaires

- Hémogramme
- Hémoculture $\times 2$
- VS non spécifique
- Uricémie
- Sérodiagnostic de la maladie de Lyme (zones endémiques)
- Analyse du liquide synovial à la recherche de cristaux (uriques, calciques)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (peut révéler les infiltrats ronds ou ovales du syndrome de Löffler)
- Radiographie standard et transit gastro-intestinal pouvant montrer des amas de vers dans les anses intestinales
- Échographie et cholangiopancréatographie rétrograde quand on suspecte la présence de vers dans les voies biliaires

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Recherche microscopique d'œufs dans les selles
- Dosage des anticorps *Ascaris* IG4 par technique ELISA

Examens complémentaires

- Nombre d'éosinophiles
- NFS
- Transaminases

Algorithme diagnostique

Figure 9 Ascariase. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- L'échographie de l'abdomen et du pelvis est le meilleur examen initial

Examens complémentaires

- TDM de l'abdomen et du pelvis

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Analyse du liquide de la ponction exploratrice recherchant LDH, glucose, albumine, protéines totales

Examens complémentaires

- Le liquide d'ascite est analysé pour recherche du nombre et du type de cellules, cytotactériologie, cultures bactérienne et fongique, amylase
- Dosage de la LDH sérique, protéinémie, albuminémie
- NFS, transaminases, azotémie, créatininémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM haute résolution sans produit de contraste du thorax (utilisant des fenêtres de 1 à 1,5 mm pour chaque 1 cm d'acquisition)

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique antéropostérieure (révèle habituellement des signes d'hyperventilation, des voies aériennes épaissies, une accumulation de mucus à la base des poumons)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Cytobactériologie du mucus, culture et antibiogramme
- NFS
- Électrophorèse à la recherche d'hypogammaglobulinémie
- Test à la tuberculine
- Recherche d'anticorps antiaspergillose
- Test de la sueur (ionophorèse à la pilocarpine) si suspicion de mucoviscidose

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie transrectale (utile pour guider l'aiguille de biopsie)

Examens complémentaires

- IRM du pelvis (utile pour détecter la dissémination locale et l'atteinte métastatique des ganglions lymphatiques)
- Scintigraphie osseuse (utile seulement si des métastases osseuses sont suspectées cliniquement)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie prostatique

Examens complémentaires

- PSA total, PSA libre (PSA libre élevé chez les hommes ayant une HBP, alors que le PSA complexé est plus élevé chez les porteurs d'un cancer prostatique)

Algorithme diagnostique

Figure 10 Scintigraphie osseuse au technétium. L'augmentation du traceur radioactif visible à travers le squelette axial est secondaire à des métastases du cancer de la prostate. (Source : Hochberg MC, Silma AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, eds : Rheumatology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2003.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM des parotides avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- IRM de la parotide (également un excellent moyen de diagnostic)
- Sialographie par IRM ou TDM (utile pour évaluer l'obstruction de la glande salivaire)
- L'échographie de la parotide est un bon moyen de recherche d'un calcul salivaire

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie tissulaire

Examens complémentaires

- NFS
- Calcémie
- Transaminases

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM haute définition du pancréas avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- IRM abdominale si la TDM est douteuse
- Échographie endoscopique
- Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie tissulaire

Examens complémentaires

- Phosphatase alcaline sérique
- Transaminases

Algorithme diagnostique

Figure 11 Cancer du pancréas sur la TDM. (Source : Talley NJ, Martin CJ : Clinical Gastroenterology, ed 2, Sidney, Churchill Livingstone, 2006.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler scrotal (meilleur test de dépistage)

Examens complémentaires

- TDM thoracique, abdominale et pelvienne si confirmation du diagnostic

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage des marqueurs sériques
α-fœtoprotéine et β-gonadotrophine (élevés)

Examens complémentaires

- LDH sérique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échocardiogramme

Examens complémentaires

- IRM si épaississement péricardique ou tumeur
- ECG

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TSH
- Créatininémie
- Transaminases
- VS

Algorithme diagnostique

Figure 12 Radiographie thoracique d'un patient atteint d'une péricardite montrant un cœur typiquement en « bouteille d'eau ». (Source : Crawford MH, DiMarco JP, Paulus WJ, eds : Cardiology, ed 2, St. Louis, Mosby, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler carotidien (meilleur examen initial)

Examens complémentaires

- Angiographie-IRM (ARM) de la circulation cérébrale
- Échocardiographie pour éliminer une origine embolique
- IRM cérébrale avec diffusion pondérée (pour exclure un thrombus)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Bilan lipidique
- VS (pour exclure artérite temporale)

Examens complémentaires

- NFS
- TP, TCA, nombre de plaquettes
- VDRL, toxicologie (suivant l'âge du patient et son anamnèse)
- Bilan de la coagulation chez un patient jeune ou suivant l'historique familial de coagulopathie (protéines C, S, antigène anticardiolipidique, taux de fibrinogène)
- AAN

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie de l'abdomen en première intention. Visualise la vésicule biliaire et les voies biliaires pour différencier un obstacle extrahépatique d'une cholestase intrahépatique ; non sensible mais spécifique de calculs biliaires

Examens complémentaires

- TDM moins précise pour la recherche de calculs mais plus sensible pour visualiser la dilatation des voies biliaires et parfaite pour révéler un cancer
- La CPRE est indiquée si la TDM ou l'échographie sont incertaines. Elle confirme l'obstruction et le degré. Elle permet une cytologie brossage
- La CPRM peut être utilisée pour visualiser les voies biliaires et leur degré d'obstruction

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS
- Hémocultures × 2

Examens complémentaires

- Amylasémie, lipasémie
- Transaminases, phosphatase alcaline

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie de la vésicule biliaire

Examens complémentaires

- La scintigraphie à l'acide iminodiacétique (HIDA) radioactif est utilisée en cas de suspicion de calcul de la vésicule ou quand l'échographie est incertaine
- TDM de l'abdomen utile en cas de suspicion d'abcès, de cancer ou de pancréatite

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS

Examens complémentaires

- Phosphatase alcaline, bilirubinémie, transaminases
- Amylasémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler pour mesurer la pression artérielle systolique et l'indice de pression systolique cheville/bras (IPS). La normale est à 1. En cas de claudication, l'indice varie de 0,5 à 0,8. Un indice $\leq 0,3$ se voit chez les patients ayant des douleurs de décubitus ou un risque d'amputation

Examens complémentaires

- L'ARM donne des détails sur la topographie et l'extension des sténoses et des occlusions artérielles ou en cas de greffes veineuses
- L'artériographie est requise avant une reconstruction chirurgicale éventuelle

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Glycémie à jeun
- Bilan lipidique
- Créatininémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique pour exclure tout processus infectieux chez des patients atteints d'affection pulmonaire

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TP, TCA, produits de dégradation de la fibrine (PDF), D-dimères, taux de fibrinogène, plaquettes, temps de thrombine (TT)
- NFS, frottis sanguin

Examens complémentaires

- Transaminases pour exclure maladie hépatique
- Facteurs V, VII

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie standard de l'abdomen (allongé et debout ; utile pour les patients souffrant de l'abdomen ou si une occlusion est perceptible cliniquement)
- TDM de l'abdomen

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Coprocultures pour détecter la toxine de *C. difficile* (sensibilité 85 %, spécificité 100 %)

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Figure 13 TDM d'un patient atteint d'une colite pseudomembraneuse foudroyante. Les parois du côlon et du rectum sont nettement épaissies, comme le montre l'opacification du côlon et du rectum. (Source : Cohen J, Powderly WG : Infectious Diseases, ed 2, St. Louis, Mosby, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Lavement baryté si le patient refuse la coloscopie

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- TSH
- Calcémie, ionogramme, azotémie, créatininémie, transaminases

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- CPK (avec fractionnement si élevée)

Examens complémentaires

- Aldolase sérique
- Ionogramme, azotémie, créatininémie, calcémie, magnésémie, phosphatémie, glycémie
- TSH, AAN, VS
- Biopsie musculaire

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie du thorax

Examens complémentaires

- Échocardiogramme
- TDM spiralée du thorax

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Gaz du sang artériel

Examens complémentaires

- AAN, VS, créatininémie, transaminases
- NFS, électrophorèse de l'hémoglobine
- Taux de méthémoglobine

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (révélant habituellement une modification emphysémateuse)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage de l' α_1 -antitrypsine (AAT)

Examens complémentaires

- CRP
- EFR

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM cérébrale sans produit de contraste pour exclure un hématome sous-dural, une hémorragie

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Variable suivant la clinique et l'examen physique (par ex. bilan toxicologique si suspicion d'abus de substances, ponction lombaire si suspicion d'encéphalite ou de méningite, NFS si suspicion d'infection)

Examens complémentaires

- Hémocultures × 2
- Transaminases
- TSH, taux de B₁₂
- Azotémie, créatininémie, ECRU
- Gaz du sang, oxymétrie
- Ionogramme, glycémie, calcémie, phosphatémie, magnésémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- IRM cérébrale avec injection de gadolinium si l'origine neurologique du diabète insipide est confirmée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Test de privation d'eau

Examens complémentaires

- Glycémie à jeun
- Analyse d'urine (densité spécifique < 1,005 ; sans glycosurie)
- Osmolarité urinaire (< 200 mOsm/kg)
- Osmolarité sérique (élevée)
- Ionogramme, calcémie, azotémie, créatininémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Transit gastroduodénal si une malabsorption est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Coproculture à la recherche d'œufs et de parasites
- Examen de selles $\times 3$, à la recherche de sang
- Coloration de Soudan (dans malabsorption, atteinte des muqueuses, insuffisance pancréatique, insuffisance en sels biliaires)
- Osmolarité des selles (Na^+ , K^+) $\times 2$

Examens complémentaires

- Ionogramme sérique, azotémie, créatininémie
- Na^+ , K^+ dans les selles
- Recherche de *C. difficile* dans les selles
- NFS, transaminases
- TSH, T_4 libre
- Albuminémie, protéines totales, glycémie
- Coprocultures pour *Escherichia coli*, *Shigella*, *Salmonella*, *Yersinia*, *Campylobacter*, *Entamoeba histolytica*
- Ac antigliadine IgA, Ac endomysial
- Biopsie colique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM (sensibilité 83–100 %). Examen le plus performant pour diagnostiquer en premier une dissection aortique

Examens complémentaires

- IRM (sensibilité 90–100 %) difficile si patient intubé, agité
- Échocardiographie transœsophagienne (ETO) (sensibilité 97–90 %) ; peut aussi détecter une insuffisance aortique ou un épanchement péricardique
- Aortographie avec emploi de produit de contraste (sensibilité 80–90 %) ; Visualise également les artères coronaires
- Radiographie thoracique, ECG

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Azotémie, créatininémie

Algorithme diagnostique

Figure 14 Dissection aortique. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Scintigraphie au Tc-99m (scintigraphie de Meckel)

Examens complémentaires

- Échographie ou TDM de l'abdomen et du pelvis

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Figure 15 Imagerie nucléaire d'un diverticule de Meckel. L'augmentation de la fixation du radionucléotide s'explique par la présence d'une muqueuse stomacale ectopique (flèche) dans le diverticule de Meckel. Le patient âgé de 11 mois avait présenté un saignement brutal. (Remerciements au Dr Kieran McHugh et reproduit avec l'autorisation de Nolan DJ : Schweiz Med Wochenschr 128 : 109-114, 1998.) (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM de l'abdomen et du pelvis avec produit de contraste IV et per os révélant l'épaississement de la paroi intestinale et un abcès en formation

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS
- Hémocultures × 2

Examens complémentaires

- ECBU
- Transaminases, créatininémie, azotémie, ionogramme, amylasémie
- Test de grossesse chez la femme en âge de procréer

Algorithme diagnostique

60. Douleur de l'articulation sacro-iliaque

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie du pelvis et du rachis lombaire antéropostérieur (AP)

Examens complémentaires

- IRM du pelvis sans produit de contraste ou scintigraphie (seulement sur patients sélectionnés)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- VS (non spécifique)
- Calcémie, phosphatase alcaline
- AAN

Algorithme diagnostique

61. Douleur du genou

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- IRM du genou si antécédent de traumatisme

Examens complémentaires

- Radiographie standard du genou

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Arthrocentèse et analyse du liquide synovial si épanchement artériel

Examens complémentaires

- Uricémie
- NFS, VS
- Sérologie de la maladie de Lyme (Western blot)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie pelvienne

Examens complémentaires

- TDM spiralée de l'abdomen et du pelvis avec injection IV de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage des β -HCG

Examens complémentaires

- ECBU, culture et antibiogramme
- NFS
- Recherche de gonocoques, hémocultures $\times 2$

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Transit gastro-intestinal si le patient refuse la fibroscopie
- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Recherche d'*H. pylori* dans les selles et par test respiratoire

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Variable suivant le diagnostic supposé

Examens complémentaires

- Fibroscopie gastrique
- Manométrie œsophagienne
- Lavement baryté, capsule vidéo intestinale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique

Examens complémentaires

- ECG
- Échocardiogramme
- EFR
- TDM hélicoidale thoracique ou scintigraphie de ventilation et perfusion

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS (pour exclure anémie, infection)

Examens complémentaires

- Gaz du sang, oxymétrie (pour exclure embolie pulmonaire)
- TSH
- Ionogramme, azotémie, créatininémie
- BNP

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie pelvienne

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Cytobactériologie, culture et antibiogramme de l'écoulement urétral
- PCR pour *Chlamydiae* et *Neisseria gonorrhoe*

Examens complémentaires

- ECBU, culture et antibiogramme
- VDRL, VIH

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- TDM abdominale et thoracique avec injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Échographie abdominale si la TDM est contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Examen histologique du kyste ou du contenu obtenu par ponction ou ablation
- Test en ELISA d'*Echinococcus granulosus*

Examens complémentaires

- ELISA ou Western blot des anticorps anti-*Echinococcus* (> 90 % de sensibilité et de spécificité pour les kystes du foie mais moins probable pour les kystes situés ailleurs)

Algorithme diagnostique

Figure 16 Échinococcose. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- Mammographie

Examens complémentaires

- Échographie
- Galactographie
- IRM du sein

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Prolactinémie

Examens complémentaires

- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Analyse de l'écoulement par coloration de Gram
- Culture de la gonorrhée sur milieu approprié ou par PCR
- Culture du *C. trachomatis* ou analyse par PCR

Examens complémentaires

- Lame humide pour le *Trichomonas*
- VIH, VDRL

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie abdominale
- TDM abdominale
- CPRE
- CPRM

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Fractionnement de la bilirubine

Examens complémentaires

- Phosphatase alcaline
- Transaminases, TP (INR)
- NFS
- Test de Coombs, haptoglobine
- Bilan hépatique
- AAN
- LDH

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- TDM du foie

Examens complémentaires

- Échographie du foie
- Radiographie du pelvis si une maladie osseuse de Paget est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- γ GT

Examens complémentaires

- Calcémie, phosphatémie
- Transaminases

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Fractionnement des CPK

Examens complémentaires

- Taux des troponines
- NFS, azotémie, transaminases, créatininémie
- TSH, ECBU

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- TDM du foie

Examens complémentaires

- Échographie du foie

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Ferritinémie, saturation de la sidérophiline
- Sérologie des hépatites virales
- γ GT, phosphatase alcaline, bilirubinémie
- Anticorps antimitochondries, anticorps antimuscles lisses, AAN

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- La TDM spiralee avec injection de produit de contraste est le meilleur examen de dépistage pour éliminer une embolie chez les patients ayant une radiographie pulmonaire anormale

Examens complémentaires

- Scintigraphie de ventilation et perfusion (quand elle est réalisable facilement, employée comme examen initial chez les patients ayant une radiographie pulmonaire anormale)
- L'angiographie pulmonaire est le gold standard mais elle est invasive et pas facilement réalisable
- Échographie duplex compressive des membres inférieurs (utile chez les patients à haut risque et avec une TDM ou une scintigraphie pulmonaire incertaines)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- D-dimères par test en ELISA (un taux de D-dimères normal exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire chez le patient douteux ; un taux normal chez un patient qui a une scintigraphie pulmonaire négative, un Doppler des membres inférieurs négatif et peu de signes cliniques exclut une thrombose veineuse profonde)

Examens complémentaires

- Gaz du sang (PaO_2 , PaCO_2 diminuées, pH augmenté)
- Gradient alvéoloartériel en oxygène (mesure la différence de la concentration en oxygène entre l'alvéole pulmonaire et le sang artériel)

Algorithme diagnostique

Tableau 1 Avantages et inconvénients des techniques d'imagerie pour le diagnostic d'une embolie pulmonaire (EP)

Caractéristique	Échocardiographie transthoracique	TDM pulmonaire	Angiographie pulmonaire	TDM spiralée
Très disponible	+++	+++	++	++
Non invasive	+++	++	-	++
Peu dépendante de l'observateur	++	++	++	++
Bien tolérée	+++	++	+	++
Détecte les EP massives	+++	++	+++	+++
Détecte l'origine de l'EP		+	+++	++
Peu coûteuse	+++	++	+	+

+++ Excellent ; ++ satisfaisant ; + moyen ; - à ne pas utiliser.

D'après Crawford MH, DiMarco JP, Paulus WJ, eds : *Cardiology*, ed 2, St. Louis, Mosby, 2004.

75. Endocardite infectieuse (bactérienne)

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Échocardiographie transœsophagienne (ETO)

Examens complémentaires

- Échocardiographie transthoracique si l'ETO n'est pas réalisable ou si le patient n'est pas coopératif

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Hémoculture × 3

Examens complémentaires

- NFS
- VS (non spécifique)
- ECRU

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Laparoscopie
- Échographie pelvienne à la recherche de tumeur annexielle
- TDM ou IRM abdominopelvienne
- Coloscopie

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- CA 125 (si > 35 U/ml, valeur prédictive positive de 0,58 et valeur prédictive négative de 0,96 pour la présence d'endométriose)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM ou échographie des reins et de la vessie
- Enregistrement polygraphique du sommeil
- Bilan urodynamique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- ECBU, culture et antibiogramme

Examens complémentaires

- Glycémie
- Ionogramme
- Azotémie
- Créatininémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie standard de l'articulation atteinte si antécédents de traumatisme

Examens complémentaires

- IRM de l'articulation atteinte si une rupture ligamentaire est suspectée
- TDM si une fracture suspectée n'est pas visible sur les radiographies standard

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Arthrocentèse avec analyse du liquide synovial (cytobactériologie, culture, antibiogramme, examen des cristaux sous lumière polarisée)

Examens complémentaires

- Sérologie de Lyme (Western blot) en zone d'endémie
- Culture sur milieu de Thayer-Martin
- Cultures anaérobies
- Cultures pour recherche de tuberculose et mycoses

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique

Examens complémentaires

- TDM thoracique sans injection de produit de contraste
- Échographie (si nécessaire) pour indication de thoracentèse

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Analyse du liquide pleural après thoracentèse pour pH, LDH, glycémie, nombre de cellules, protéines

Examens complémentaires

- Protéines totales, albuminémie, LDH, glycémie
- NFS
- Biopsie pleurale
- Adénosine désaminase (ADA)
- Analyse cytologique

Algorithme diagnostique

Figure 17 Épanchement pleural à la base du poumon. **A.** Sur le cliché antéropostérieur vertical, l'épanchement simule un hémidiaphragme élevé. **B.** En décubitus latéral droit, le cliché montre l'épanchement. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphie, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie des tissus mous latéraux du cou

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (une pneumonie est présente dans plus de 20 % des épiglottites)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Hémocultures $\times 2$
- Culture du prélèvement épiglottique (seulement si l'environnement ORL est contrôlé, par ex. en salle d'opération)

Algorithme diagnostique

81. Épilepsie

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM cérébrale

Examens complémentaires

- TDM cérébrale avec et sans injection de produit de contraste si l'IRM est contre-indiquée ou si une hémorragie est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Glycémie, ionogramme
- NFS
- Bilan toxicologique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie musculaire

Examens complémentaires

- NFS
- CPK, aldolase
- VS (non spécifique)
- TSH
- Ionogramme, azotémie, créatininémie, glycémie, calcémie
- B₁₂, AAN

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- ECG
- Enregistrement polygraphique du sommeil

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS

Examens complémentaires

- TSH, taux de B₁₂
- Ionogramme, azotémie, créatininémie
- Transaminases, glycémie à jeun
- Titrage des virémies EBV, CMV
- VS (non spécifique)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- Échocardiogramme (si les hémocultures sont positives ou si une endocardite bactérienne subaiguë est suspectée cliniquement)
- TDM du thorax et abdominopelvienne

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Hémocultures × 2
- ECBU, culture et antibiogramme
- VS, AAN
- Transaminases, créatininémie
- VIH, TCT
- Ac cANCA, pANCA

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie de la thyroïde

Examens complémentaires

- Scintigraphie à l'iode radioactif

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TSH, T_4 libre

Examens complémentaires

- NFS
- Ac antimicrosomiaux
- Taux de thyroglobuline

Algorithme diagnostique

Figure 18 Scintigraphie thyroïdienne au TC-99m d'un goitre multinodulaire. (Source : Besser CM, Thorne MO : *Comprehensive Clinical Endocrinology*, ed 3, St. Louis, Mosby, 2002.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie standard de l'articulation atteinte quand le diagnostic est peu clair

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Examen du liquide synovial aspiré de l'articulation atteinte pour rechercher la présence de cristaux d'acide urique (pointus et biréfringents)

Examens complémentaires

- Uricémie
- NFS, VS si une infection est suspectée
- Cytobactériologie du liquide synovial aspiré, cultures et antibiogramme

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique (qui peut révéler de multiples nodules bilatéraux, des cavités multiples, un épanchement pleural)

Examens complémentaires

- Échographie des reins
- TDM des sinus et du thorax

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie de l'organe atteint (par ex. poumons, nasopharynx)

Examens complémentaires

- Recherche des cANCA
- ECBU (hématurie, rouleaux de GR, protéinurie)
- NFS (anémie, leucocytose)
- Azotémie, créatininémie (augmentées)
- VS augmentée

Algorithme diagnostique

Figure 19 Granulomatose de Wegener. **A.** Radiographie thoracique montrant des zones d'opacités bilatérales aériques ; on ne voit pas d'excavation. **B.** Coupe TDM des régions supérieures montrant des zones multifocales d'opacification de parenchyme densifié. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie transvaginale

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- β -HCG (quantitatif)

Examens complémentaires

- Progestéronémie (production diminuée dans la grossesse ectopique)
- NFS
- ECBU

Algorithme diagnostique

Figure 20 Grossesse ectopique. (D'après Weissleder R, Wittenber J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Figure 21 Échographie montrant une grossesse ectopique. **A.** Échographie transabdominale montrant un utérus vide avec une masse complexe dans l'annexe droite mesurant 21×22 mm. **B.** Échographie transvaginale montrant un sac gestationnel dans l'utérus et une réaction déciduale avec un endomètre fortement épaissi. Il y a du liquide libre dans le cul-de-sac de Douglas (du sang peut être trouvé en cas de rupture de grossesse ectopique). (Source : Greer JA, Cameron IT, Kitchener HC, Prentice A : Mosby's Color Atlas and Text of Obstetrics and Gynecology, Londres, Harcourt, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Mammographie/sonographie si gynécomastie unilatérale
- IRM de l'hypophyse avec injection de produit de contraste si prolactinémie élevée
- Échographie des testicules quand une atteinte testiculaire est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Testostéronémie, LH et prolactinémie

Examens complémentaires

- Transaminases, créatininémie, ECBU
- Estradiol sérique, β -HCG

Algorithme diagnostique

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Échographie fœtale

Examens complémentaires

- Enregistrement continu de l'activité cardiaque fœtale par capteur externe (monitorage)

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS (pour quantifier la perte de sang)
- Bilan de la coagulation (TP, TCA, plaquettes, fibrinogènes)
- Groupage sanguin et phénotypage du système Rhésus pour identifier les patientes Rh- qui auraient besoin d'immunoglobulines Rh

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM cérébrale sans injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TP, TCA, plaquettes
- NFS

Algorithme diagnostique

Figure 22 Hématome sous-dural. (D'après Weisleder R, Wittenberg J, Harisinghini MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie des reins et de la vessie

Examens complémentaires

- TDM spiralée abdominopelvienne sans injection de produit de contraste ; utile pour exclure tumeur rénale ou calculs
- Urographie IV (pour détecter davantage de calculs et des nécroses papillaires)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Hématurie microscopique
- ECBU, cultures et antibiogramme

Examens complémentaires

- Cytologie urinaire × 3
- Azotémie, créatininémie
- NFS, nombre de plaquettes, TP, TCA

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM sans contraste ou IRM du foie ; utile pour éliminer d'autres causes d'élévation des enzymes hépatiques ; l'imagerie hépatique peut révéler une augmentation de la densité du tissu hépatique et utile également pour détecter un cancer hépatique (risque augmenté chez les patients cirrhotiques)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Le coefficient de saturation de la transferrine est le meilleur test de dépistage
- La ferritinémie est un bon indicateur de la charge en fer du corps, mais peut être élevée dans de nombreuses autres circonstances (par ex. inflammation, cancer)
- Mesure de l'index du fer hépatique (concentration du fer hépatique/âge) sur la biopsie hépatique pour confirmer le diagnostic

Examens complémentaires

- Transaminases, phosphatase alcaline
- Recherche génétique (phénotype HFE pour les mutations C282Y et H63D)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Facteur VIII (diminué dans l'hémophilie A)
- Facteur IX (diminué dans l'hémophilie B)

Examens complémentaires

- TCA (augmenté), TP (normal)
- Analyse de la fonction plaquettaire (étude de la durée de vie plaquettaire), antigène facteur VIII, taux de fibrinogène
- Nombre de plaquettes, NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique

Examens complémentaires

- Échocardiogramme
- TDM spiralee du thorax

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TP, TCA, plaquettes
- Cytobactériologie des crachats, cultures et antibiogramme
- NFS
- Gaz du sang ou oxymétrie transcutanée

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM cérébrale sans injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Artériographie cérébrale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TP, TCA, plaquettes
- NFS

Algorithme diagnostique

Figure 23 Hémorragie méningée. (D'après Weisleder R, Wittenberg J, Harisinghini MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie obstétricale

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage quantitatif des β HCG

Examens complémentaires

- NFS, nombre de plaquettes
- TP et TCA

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie hépatique ou TDM chez les patients atteints d'hépatite fulminante

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Les Ac IgM anti-VHA confirment le diagnostic ; détectables chez presque tous les patients infectés au début et restent positives de 3 à 6 mois

Examens complémentaires

- Les Ac IgG anti-VHA peuvent être présentes au départ et culminer après 6 à 12 mois ; peuvent persister des années
- Transaminases (très élevées), phosphatase alcaline (moyennement élevée), bilirubine (élevée)
- TP (INR) (élevé dans les cas sévères)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie hépatique ou TDM chez les patients atteints d'hépatite fulminante

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- La présence d'Ac anti-HBc (IgM) confirme soit la phase aiguë, soit la phase précoce de l'infection par le VHB
- L'Ag HBs est détecté dans la phase aiguë ou chronique de l'hépatite B
- L'Ag HBe est le marqueur de la phase aiguë

Examens complémentaires

- Transaminases (très élevées), phosphatase alcaline (moyennement élevée), bilirubine (élevée)
- TP (INR) (élevé dans les cas sévères)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie hépatique ou TDM chez les patients atteints d'hépatite fulminante ou d'hépatite C chronique (augmente le risque d'hépatocarcinome)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- L'ARN VHC détecte le virus dès 2 à 4 semaines après l'exposition
- Les anticorps VHC cherchés par tests immuno-enzymatiques (EIA) indiquent une infection présente ou passée mais ne permettent pas de différencier entre une infection aiguë, chronique ou finie ; tous les résultats EIA positifs doivent être vérifiés par un test supplémentaire (par ex. un test multiantigènes [RIBA])
- Le génotypage peut distinguer les génotypes 1, 2, 3 ou 4, ce qui est utile pour le choix thérapeutique

Examens complémentaires

- Transaminases (très élevées), phosphatase alcaline (moyennement élevée), bilirubine (élevée)
- TP (INR) (élevé dans les cas sévères)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Bilan hépatique (incluant Ag HBs, IgM anti-HBc, IgM anti-VHA, IgM anti-VHC)

Examens complémentaires

- Transaminases
- Phosphatase alcaline, bilirubinémie, TP
- AAN, anticorps antimuscle lisse, anticorps antimitochondrial si hépatite auto-immune suspectée

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM abdominale

Examens complémentaires

- Échographie abdominale si TDM contre-indiquée
- Échocardiographie si une hépatomégalie congestive est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie hépatique

Examens complémentaires

- Transaminases, phosphatase alcaline
- Bilirubinémie, bilan hépatique, NFS
- Glycémie, albuminémie, INR
- AAN, AMC, coefficient de saturation de la transferrine, cuprémie, céruléoplasminémie, taux d' α_1 -antitrypsine

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM ou IRM des surrénales avec injection de produit de contraste (pour exclure une tumeur)
- Échographie pelvienne (pour exclure tumeur ovarienne, ovaires polykystiques)
- IRM hypophysaire (pour exclure tumeur hypophysaire)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Testostéronémie, déhydroépiandrostérone et 17-hydroxyprogesterone

Examens complémentaires

- Test de freinage à la dexaméthasone
- LH, FSH, glycémie

Algorithme diagnostique

104. Hydrocéphalie à pression normale

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM cérébrale sans produit de contraste

Examens complémentaires

- TDM cérébrale sans produit de contraste si l'IRM est contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Analyse du liquide céphalorachidien (LCR)

Examens complémentaires

- ECBU, culture et antibiogramme
- Glycémie à jeun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie des os douloureux (pour exclure cancer, myélome multiple)
- Scintigraphie des parathyroïdes au Tc-99m (pour exclure un adénome parathyroïdien)
- Échographie des parathyroïdes
- Échographie des reins (pour exclure un cancer)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Calcémie
- Taux de PTH

Examens complémentaires

- Phosphatémie, magnésémie, phosphatase alcaline, albuminémie
- Ionogramme, azotémie, créatininémie
- Recueil des urines sur 24 h pour calciurie
- AMP cyclique urinaire
- PSA (si un cancer de la prostate est suspecté)
- Immunoélectrophorèse des protéines sériques et urinaires (si un myélome multiple est suspecté)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Kaliémie sur prélèvement héparinisé

Examens complémentaires

- Ionogramme, azotémie, créatininémie
- Glycémie, NFS
- CPK (quand une rhabdomyolyse est suspectée)

Algorithme diagnostique

Figure 24 La modification la plus précoce dans l'hyperkaliémie est l'apparition d'ondes T hautes et pointues. Avec l'augmentation progressive du taux de kaliémie, les complexes QRS s'élargissent, l'onde P diminue en amplitude et peut disparaître ; finalement une onde d'aspect sinusoïde conduit à l'asystolie. (Source : Goldberger AL : Clinical Electrocardiography, ed 6, St Louis, Mosby, 1999.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Taux de magnésium sur urines de 24 h

Examens complémentaires

- Ionogramme, calcémie
- Azotémie, créatininémie, glycémie
- TSH
- CPK

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme

Examens complémentaires

- Sodium urinaire, osmolarité urinaire
- Azotémie, créatininémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Recueil des urines de 24 h pour dosage du phosphate urinaire

Examens complémentaires

- Ionogramme sérique, azotémie, créatininémie, magnésium, calcium et glucose urinaires
- ECBU, CPK

Algorithme diagnostique

110. Hypertension portale

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Écho-Doppler abdominal

Examens complémentaires

- TDM ou IRM peuvent être utilisées quand les résultats du Doppler sont douteux
- ARM (utile pour détecter une obstruction de la veine porte)
- Fibroscopie (pour exclure des varices œsophagiennes)

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS, numération plaquettaire
- Recherche de virus hépatiques
- Transaminases, TP, TCA, albuminémie
- Ac antimuscle lisse, Ac anti-antimitochondries, taux de céruloplasmine, immunoelectrophorèse des protéines sériques

Algorithme diagnostique

111. Hypertension pulmonaire

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Cathétérisme cardiaque avec mesure directe de la pression de l'artère pulmonaire (utile pour exclure une origine cardiaque à l'hypertension pulmonaire)

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (qui peut révéler une dilatation des artères centrales avec un rétrécissement rapide des artères distales)
- Échocardiogramme (pour évaluer la fonction ventriculaire et exclure une pathologie valvulaire significative)
- TDM spiralée du thorax si une embolie pulmonaire est suspectée

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS (érythrocytose)
- Gaz du sang (PaO₂ diminuée, saturation en O₂ diminuée)
- Éprouves fonctionnelles pulmonaires (pour exclure une maladie pulmonaire obstructive ou restrictive)
- ECG (hypertrophie ventriculaire droite)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie thyroïdienne
- Scintigraphie à l'iode radioactif

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TSH, T_4 libre

Examens complémentaires

- T_3 libre
- Taux de thyroglobuline
- Ac antimicrosomiaux

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- PTH

Examens complémentaires

- Albuminémie
- Phosphatémie, magnésémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- IRM cérébrale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- LH, FSH
- Testostéronémie

Examens complémentaires

- Analyse du sperme
- Prolactinémie
- Stimulation par l'HCG
- Caryotype des chromosomes
- Fructose du liquide séminal
- Biopsie testiculaire

Algorithme diagnostique

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Excrétion du potassium sur urines de 24 h

Examens complémentaires

- Ionogramme, azotémie, créatininémie
- Chlorure urinaire
- Rénine plasmatique, aldostéronémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage du magnésium sur les urines des 24 h

Examens complémentaires

- Ionogramme, calcémie, phosphatémie, glycémie, albuminémie
- Azotémie, créatinémie
- TSH
- Natriurie

Algorithme diagnostique

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Ionogramme plasmatique
- Osmolarité plasmatique

Examens complémentaires

- Glycémie, azotémie, créatininémie
- Uricémie
- Osmolarité urinaire
- TSH
- Cortisol plasmatique
- Excrétion du sodium urinaire

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Phosphaturie des 24 h

Examens complémentaires

- Ionogramme, calcémie, créatinémie, glycémie
- Gaz du sang

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- IRM de l'hypophyse avec injection de produit de contraste si une hypothyroïdie secondaire est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TSH

Examens complémentaires

- Ac antimicrosomaux si une thyroïdite de Hashimoto est suspectée
- Taux de thyroglobuline quand une thyroïdite subaiguë est suspectée
- T_4 libre

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie rénale

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (pour exclure épanchement pleural, syndromes pulmonaires/rénaux [par ex. Goodpasture ou Wegener])
- TDM des reins sans produit de contraste (pour exclure obstruction)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Rapport azotémie/créatininémie (> 20:1 en pré- et post-rénal ; < 20:1 en insuffisance rénale intrinsèque)

Examens complémentaires

- Osmolarité sérique, osmolarité urinaire, Ionogramme, calcémie, phosphatémie, uricémie, magnésémie
- Calcul fractionné de l'excrétion du sodium ($F_{Na} = \text{Una/Pna/Ucreat/Precreat} \times 100$) ; $F_{Na} < 1$ si pré-rénal, > 1 si insuffisance rénale intrinsèque

Algorithme diagnostique

121. Insulinome

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM ou IRM abdominales avec injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Scintigraphie à l'octréotide

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Glycémie, insulinémie, peptide C, taux de sulfonylurée

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Test d'effort nucléaire

Examens complémentaires

- Échocardiogramme d'effort
- Radiographie thoracique
- ECG
- Cathétérisme cardiaque

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Troponines cardiaques
- CPK-MB × 2

Examens complémentaires

- Bilan lipidique
- Glycémie, créatinémie
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste si jaunisse non douloureuse
- Échographie abdominale si jaunisse douloureuse

Examen(s) complémentaires

- CPRE
- CPRM
- Échographie endoscopique (EE)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Bilirubine fractionnée
- Phosphatase alcaline, transaminases
- Bilan des hépatites virales

Examen(s) complémentaires

- Amylasémie, lipasémie, LDH
- NFS, taux de réticulocytes, test de Coombs
- Azotémie, créatininémie, ionogramme
- Biopsie hépatique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie du membre inférieur concerné

Examens complémentaires

- IRM du genou avant l'intervention chirurgicale pour identifier une pathologie coexistante de l'articulation

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Variable suivant l'aspect de la lésion

Examens complémentaires

- VDRL
- Biopsie de la lésion
- Fixation du complément pour le LGV
- Recherche par immunofluorescence pour *Chlamydia trachomatis*
- Sérologie ou cultures de l'herpès simplex
- VIH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Lame humide et lame avec une solution d'hydroxyde de potassium

Examens complémentaires

- Culture de gonorrhée en milieu approprié
- Culture pour *C. trachomatis*
- VIH
- Recherche par PCR de gonocoque

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie de la vésicule biliaire utile pour détecter les calculs ou la boue biliaire (sensibilité 95 %, spécificité 90 %)

Examens complémentaires

- TDM de l'abdomen lorsque l'échographie n'est pas contributive pour éliminer un cancer, un abcès ; toutefois, moins sensible que l'échographie pour la lithiase

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Bilan lipidique
- Bilirubinémie, transaminases, phosphatase alcaline

Algorithme diagnostique

128. Lithiase rénale

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM hélicoïdale de l'appareil urinaire sans injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Échographie rénale, urographie IV (montre la taille et la localisation des calculs)
- Radiographie d'abdomen sans préparation (peut identifier des calculs radio-opaques (calcium))

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- ECBU

Examens complémentaires

- Analyse chimique des calculs évacués
- Calcémie, phosphorémie, uricémie, azotémie, créatininémie
- Uroculture et antibiogramme
- Analyse de l'excrétion urinaire du calcium sur 24 h des patients ayant des calculs rénaux

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Sialographie

Examens complémentaires

- TDM des glandes salivaires si un cancer est suspecté

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Calcémie, phosphatémie
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM du rachis lombosacré

Examens complémentaires

- Radiographie standard du rachis
- Scintigraphie osseuse du rachis lombosacré si l'IRM est contre-indiquée
- Échographie ou TDM de l'aorte abdominale si un anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) est suspecté

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- VS
- ECRBU

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Mammographie (femmes)
- Radiographie du thorax ou TDM
- Échographie du creux axillaire

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie du ganglion lymphatique

Examens complémentaires

- NFS
- VIH, MNI test, titrage viral (CMV, EBV)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie standard du thorax
- TDM du cou avec injection de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie du ganglion lymphatique

Examens complémentaires

- NFS
- Titrage viral (EBV, CMV)
- Titrage du *Toxoplasma*
- Cytobactériologie, culture et antibiogramme d'un prélèvement de gorge

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie standard du thorax

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie du ganglion lymphatique

Examens complémentaires

- NFS
- Biopsie des lésions cutanées suspectes sur l'avant-bras, la main (exclure mélanome)
- VDRL, VIH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- TDM des thorax, abdomen et pelvis avec injection IV de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie du ganglion lymphatique

Examens complémentaires

- NFS
- VIH, titrage viral (EBV, CMV)
- Titrage *Toxoplasma*
- Transaminases
- Hémocultures × 2
- Biopsie de moelle osseuse
- VDRL
- VS (non spécifique)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM abdominopelvienne avec injection IV de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie du ganglion lymphatique

Examens complémentaires

- NFS
- VDRL
- Recherche sérologique de *Chlamydia trachomatis*
- VIH
- VS (non spécifique)
- Culture sur milieu pour gonocoque
- Cultures VHS
- Biopsie de lésions cutanées (pour exclure mélanome)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Scintigraphie lymphatique (sensibilité et spécificité de 100 % dans le diagnostic de lymphœdème)

Examens complémentaires

- TDM abdominopelvienne avec injection IV de produit de contraste pour exclure un blocage dû à un cancer important
- Lymphographie (rarement utilisée et difficilement performante ; peut être demandée par le chirurgien pour le repérage du niveau d'excision)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie, transaminases
- Albuminémie
- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Nombre de réticulocytes

Examens complémentaires

- Taux de B_{12} , de folates
- TSH, transaminases
- LDH, bilirubinémie, haptoglobulinémie
- AAN, test de Coombs si une anémie hémolytique est suspectée

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (pour éliminer une origine pulmonaire)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Électrophorèse des protéines (montre un pic d'IgM monoclonales)
- Immunoélectrophorèse (IEP)

Examens complémentaires

- NFS (anémie)
- VS (augmentée par la formation des rouleaux)
- IEP des protéines urinaires (chaînes légères monoclonales, habituellement kappa)
- Biopsie de moelle osseuse
- Cryoglobulines
- Hyperviscosité sérique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Transit baryté de l'intestin grêle
- Endoscopie avec biopsie du duodénum et du jéjunum
- Capsule endoscopique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Anticorps IgA anti-endomysium, meilleur test
- Anticorps antigliadine élevé chez plus de 90 % des patients

Examens complémentaires

- NFS, taux de B₁₂, de folate
- Magnésémie, albuminémie, calcémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM ou IRM des surrénales avec injection de produit de contraste
- Radiographie pulmonaire

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Test de stimulation par l'ACTH
- Dosages répétés de cortisol sanguin

Examens complémentaires

- Ionogramme (hyponatrémie, hyperkaliémie)
- Glycémie, azotémie, créatininémie
- NFS (anémie)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Tomographie par émission de positons (TEP) ou scintigraphie cérébrale à l'examétazine (patients sélectionnés)
- TDM ou IRM pour éliminer hydrocéphalie, tumeur ou atrophie cérébrale (patients sélectionnés)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TSH, dosage B₁₂, acide méthylmalonique
- VDRL ou VIH sur patients sélectionnés
- Métabolisme de base

Algorithme diagnostique

143. Maladie de von Willebrand

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Facteur de von Willebrand (diminué)
- Diminution ou absence d'agrégation des plaquettes en présence de ristocétine sur le plasma riche en plaquettes du patient
- Temps de saignement augmenté
- Étude de l'agrégation plaquettaire
- TCA prolongé

Examens complémentaires

- Activité diminuée du facteur VIII
- Taux de plaquettes (normal)
- Agrégation plaquettaire (normale)
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM du foie dans les cas douteux

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Taux de céruloplasmine (bas)
- Taux sérique de cuivre (bas)
- Taux d'excrétion urinaire des 24 h du cuivre (augmenté)

Examens complémentaires

- NFS, bilirubinémie, taux de réticulocytes, haptoglobulinémie si anémie hémolytique suspectée
- Transaminases (augmentées)
- Biopsie hépatique démontrant l'augmentation du cuivre hépatique (> 250 $\mu\text{g/g}$ de poids sec, normale à < 50 $\mu\text{g/g}$)
- Taux sérique d'acide urique et de phosphate (bas)
- ECBU (hématurie)

Algorithme diagnostique

145. Maladie des griffes du chat

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Culture d'une aspiration d'un ganglion lymphatique
- Biopsie du ganglion hypertrophié (la coloration à l'argent de Warthin-Starry est utilisée pour identifier le bacille)

Examens complémentaires

- Test cutané de la maladie des griffes du chat
- NFS
- VS (non spécifique)
- Ponction lombaire si signes neurologiques

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie rénale

Examens complémentaires

- TDM ou IRM des reins (plus sensibles que l'échographie et indiquées pour tout ce qui concerne des lésions solides)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS (érythrocytose secondaire à l'élévation de l'érythropoïétine)
- Azotémie, créatininémie, ionogramme, ECBU
- Dosage de l'érythropoïétine
- Génotypage : gène *PKD1* défectueux sur le chromosome 16 ou sur le 4 (*PKD2*)

Algorithme diagnostique **Rein polykystique**

Figure 25 Reins polykystiques. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie standard des os atteints (qui montrera l'opacité et la radiotransparence)

Examens complémentaires

- Scintigraphie osseuse (qui révélera l'activité et l'extensivité de la maladie)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Phosphatase alcaline sérique (augmentée)

Examens complémentaires

- Calcémie, phosphatémie

Algorithme diagnostique

148. Mastoïdite

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM de l'atteinte mastoïdienne avec injection de produit de contraste (qui peut montrer la mastoïdite avec la destruction de l'os)

Examens complémentaires

- Radiographie standard de la région mastoïdienne (pouvant montrer l'assombrissement ou l'opacification)
- IRM avec injection de produit de contraste (plus sensible qu'une scintigraphie dans l'étude de la participation des tissus mous ; et utile en conjonction avec une scintigraphie pour rechercher d'autres complications de la mastoïdite)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Cytobactériologie, culture et antibiogramme du liquide obtenu par myringotomie ou drainage de la membrane tympanique

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM ou TDM cérébrales avec injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Angiographie cérébrale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Figure 26 Méningiome sous-frontal. TDM avant (A) et après (B) injection de produit de contraste, et artériographie de la projection latérale de la carotide commune (C). Il existe une grosse masse circonscrite dans la fosse antérieure qui est identique à la matière grise normale, contenant des foyers de calcifications centraux et augmentés de manière homogène. Il y a un œdème dans la substance blanche des deux lobes frontaux et un déplacement postérieur évasant les cornes frontales des ventricules latéraux. Sur l'artériographie (C), la tumeur est délimitée par une image d'encorbellement et il existe un déplacement postérieur des artères cérébrales antérieures (*pointe de flèche*), visualisé en reflet sur la TDM. L'artère ophthalmique est élargie du fait que ses branches ethmoïdales alimentent la tumeur (*flèche*). (D'après Grainger RG, Allison DJ, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM cérébrale avec injection de produit de contraste si un déficit neurologique focal est présent à l'examen, si le patient est dans le coma, si les papilles sont anormales ou si un œdème papillaire est noté
- IRM avec injection de produit de contraste si des suites sont à craindre (par ex. abcès)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- PL et examen du LCR (pression, cyto bactériologie, protéine, glucose, nombre de globules blancs et antigène bactérien)

Examens complémentaires

- NFS
- Hémoculture × 2

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM thoracique avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- TDM abdominale avec injection IV de produit de contraste et scintigraphie osseuse pour évaluer l'extension de la maladie

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie pleurale

Examens complémentaires

- La cytologie de la thoracentèse est généralement inadéquate pour le diagnostic
- EFR

Algorithme diagnostique

Figure 27 Tumeur maligne de la plèvre épaissie sur la radiographie thoracique PA (A) et de profil (B). L'épaississement pleural malin présente typiquement des lobules et des nodules. On voit le mésothéliome sur le côté droit de ce patient. Noter l'extension de la tumeur dans la scissure. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Augmentation du volume des globules rouges

Examens complémentaires

- Nombre de réticulocytes
- Taux de ferritine
- Capacité totale de fixation du fer, fer sérique
- Électrophorèse de l'hémoglobine

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM thoracique avec injection IV de produit de contraste pour exclure un thymome (trouvé chez 12 % des patients atteints de myasthénie)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Anticorps AChR (présent chez 90 % des patients ayant une myasthénie généralisée et 60 % des patients ayant une myasthénie oculaire) ; indiqué seulement si le test à l'anticholinestérase confirme le diagnostic

Examens complémentaires

- TSH, T₄ libre (pour exclure une maladie thyroïdienne qui concerne 5 à 15 % des patients myasthéniques)
- Taux de B₁₂
- AAN, facteur rhumatoïde (risque accru d'association de myasthénie avec LED ou polyarthrite rhumatoïde)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographies standard des zones douloureuses pouvant montrer les lésions osseuses lytiques
- La scintigraphie osseuse n'est pas utile parce que les lésions ne sont pas blastiques
- Échographie des reins s'il existe une insuffisance rénale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Immunoélectrophorèse des protéines sériques et urinaires
- Frottis de moelle osseuse

Examens complémentaires

- NFS, frottis (anémie normochrome, normocytaire, formation de rouleaux, thrombocytopénie)
- Calcémie (élevée)
- ECBU (protéinurie)
- Azotémie, créatininémie, uricémie, LDH, protéines totales (toutes élevées)
- Ionogramme (trou anionique diminué, hyponatrémie)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'articulation atteinte

Examens complémentaires

- Scintigraphie des os si l'IRM est contre-indiquée
- La radiographie standard de l'articulation atteinte n'est pas contributive au début

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- VS (non spécifique)
- AAN

Algorithme diagnostique

Figure 28 Nécrose aseptique de la hanche d'un patient rénal transplanté. **A.** Au début, le changement consiste en des lignes obliques de basse intensité sur l'IRM. **B.** Plus tard, la nécrose avasculaire montre à la radiographie le rétrécissement de l'articulation de la hanche, la sclérose de la tête fémorale et l'aplatissement de la tête fémorale gauche. (Source : Johnson RJ, Feehally J : Comprehensive Clinical Nephrology, ed 2, St. Louis, Mosby, 2000.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (utile pour éliminer sarcoidose, cancer pulmonaire)
- Radiographie standard des os si suspicion de traumatisme

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS, glycémie, ionogramme, transaminases, calcémie, magnésémie, phosphatémie
- Les métaux lourds sont recherchés en cas de neuropathie toxique
- Sérologie de la maladie de Lyme en zone endémique si le patient a des antécédents suggestifs et un érythème migrant chronique (EMC) à l'examen clinique
- TSH, B₁₂, taux d'acide folique
- VIH chez les patients à risque

Algorithme diagnostique **157. Neurinome de l'acoustique****Imagerie****Examen(s) pertinent(s)**

- IRM avec injection de gadolinium du cerveau et du conduit auditif

Examens complémentaires

- TDM du cerveau et des conduits auditifs avec injection de produit de contraste si l'IRM est contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

158. Neutropénie

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Myélogramme

Examens complémentaires

- NFS
- VIH
- Hémocultures × 2
- Cytobactériologie des urines, culture et antibiogramme
- Taux de B₁₂, folates

Algorithme diagnostique

159. Névralgie du trijumeau

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de la tête et du cou avec contraste IV

Examens complémentaires

- TDM avec coupes minces de la fosse postérieure si l'IRM est contre-indiquée ; peu contributive

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- VS
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM spiralée du thorax sans contraste

Examens complémentaires

- TEP

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie à l'aiguille du ganglion

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

*Fumeur habituel ou ancien fumeur

**N'ayant jamais fumé

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie thyroïdienne pour évaluer la taille et la composition du nodule (solide versus kystique)

Examens complémentaires

- Scintigraphie thyroïdienne au Tc-99m classant le nodule en hyperfonctionnel (chaud), normal (tiède) ou non fonctionnel (froid) ; elle peut être aussi réalisée à l'iode 131

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie aspiration à l'aiguille fine (BAAF)

Examens complémentaires

- TSH, T₄ libre
- Anticorps antimicrosomiaux
- Calcémie
- Taux de thyroglobuline chez les patients ayant un cancer établi de la thyroïde

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie abdominale sans préparation

Examens complémentaires

- TDM abdominale et pelvienne avec injection de produit de contraste (pour confirmation)
- Transit baryté (peut être nécessaire pour préciser la zone d'occlusion)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Ionogramme, azotémie, créatininémie
- Transaminases, phosphatase alcaline
- ECBU, urocultures et antibiogramme
- Glycémie et amylasémie

Algorithme diagnostique

Figure 29 Occlusion de l'intestin grêle. L'occlusion de l'intestin grêle nettement distendu est identifiée par sa position centrale, les multiples boucles et les valvules conniventes. Le côlon ascendant non distendu peut être discerné. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphie, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler

Examens complémentaires

- Radiographie des membres inférieurs chez les patients ayant eu un traumatisme musculo-squelettique pour exclure une fracture
- Échocardiogramme pour exclure insuffisance cardiaque, valvulopathie
- TDM et/ou échographie du pelvis

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- D-dimères par test ELISA quand une thrombose veineuse profonde (TVP) est suspectée
- Créatininémie, albuminémie, transaminases
- TSH
- ECRBU
- Protéinurie des 24 h pour exclure un syndrome néphrotique si l'analyse d'urine révèle une protéinurie
- BNP

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique

Examens complémentaires

- Échocardiogramme
- Échographie abdominale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Albuminémie, créatininémie
- ECGU
- BNP

Examens complémentaires

- Transaminases, azotémie
- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie des reins et de la vessie

Examens complémentaires

- TDM spiralée de l'abdomen et du pelvis

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- ECBU

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie, ionogramme
- Osmolarité sérique et urinaire
- Natriurie
- Recherche de protéines sur urines de 24 h
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM avec injection de produit de contraste de l'os atteint

Examens complémentaires

- Scintigraphie osseuse triphasée au Tc-99m lié au ligand méthylène diphosphonate (MDP) (utilisée si l'IRM est contre-indiquée ou non disponible)
- Bilan Doppler du membre inférieur atteint (utilisé pour vérifier la perméabilité vasculaire de patients sélectionnés ; par ex. diabétiques)
- Radiographie standard de l'os atteint (bilan radiologique initial)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Cytobactériologie, culture osseuse après le débridement chirurgical

Examens complémentaires

- NFS
- VS
- Hémocultures × 2

Algorithme diagnostique

Figure 30 Ostéomyélite vertébrale. L'IRM avec produit de contraste en vue verticale (pondération en T1) montre un abcès épidual localisé à la partie postérieure, au niveau L4-L5, avec un bord épais et le déplacement des racines nerveuses antérieures. (Remerciement au Dr Joseph Mammane. Source : Cohen J, Powderly WG : Infectious Diseases, ed 2, St. Louis, Mosby, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'os atteint

Examens complémentaires

- TDM de l'os impliqué si l'IRM est contre-indiquée
- Scintigraphie osseuse (captation diminuée)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- VS, AAN
- Transaminases, créatininémie

Algorithme diagnostique

Figure 31 Ostéonécrose avancée de la tête fémorale (stades 5-6 de Steinberg). Grosse destruction et remodelage de la tête fémorale. Il y a des modifications arthritiques significatives. (Source : Hochberg MC, Silma AJ, Smolen JS, Weimblatt ME, Weisman MH, eds : Rheumatology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2003.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Absorptiométrie biphotonique (DXA)

Examens complémentaires

- Absorptiométrie monophotonique ou TDM quantitative ; l'absorptiométrie biphotonique est préférée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TSH
- PTH, calcémie, phosphatémie pour patients sélectionnés
- Taux de vitamine D

Algorithme diagnostique

Figure 32 Estimation d'une fracture vertébrale par absorptiométrie du rachis. L'utilisation d'image par double énergie facilite la visualisation du rachis lombosacral en une seule image. Dans cet exemple, la fracture a été identifiée au niveau de T12. (Source : Hochberg MC, Silma AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, eds : Rheumatology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2003.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Échographie abdominale quand une lithiase pancréatique est suspectée
- Radiographie standard (souvent effectuée comme examen initial en crise aiguë)
- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Amylasémie
- Lipasémie

Examens complémentaires

- Taux de trypsine sérique et du trypsinogène urinaire (tests sensibles mais peu réalisables)
- Transaminases, calcémie, glycémie, ionogramme, phosphatase alcaline
- NFS, ECBU
- Gaz du sang

Algorithme diagnostique

Figure 33 Diffusion d'une pancréatite aiguë. La TDM améliorée montre l'évolution d'une pancréatite aiguë s'étalant le long du mésocôlon transverse (*flèches*) vers le côlon transverse. L'extension phlegmoneuse à travers le mésentère de l'intestin grêle est également présente. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Churchill Livingstone, Philadelphie, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Transit baryté

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (PA et de profil)
- TDM du cou et du thorax

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

171. Perte de poids involontaire

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TSH, T₄ libre

Examens complémentaires

- NFS, glycémie
- VS (non spécifique)
- Transaminases, créatininémie, albuminémie
- ECBU

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Scintigraphie à l'iode 131 (100 % de sensibilité) ; cet analogue de la noradrénaline se localise dans les tissus adrénergiques et est particulièrement utile pour localiser les phéochromocytomes extrasurrénaux

Examens complémentaires

- IRM abdominale avec injection IV de produit de contraste
- TEP (réservée aux cas pour lesquels les symptômes cliniques suggèrent le phéochromocytome avec des résultats biologiques positifs, mais où l'imagerie habituelle ne peut localiser la tumeur)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Métanéphrines libres plasmatiques (la concentration plasmatique de normétanéphrines $> 2,5$ pmol/ml ou les métanéphrines $> 1,4$ pmol/ml suggèrent le phéochromocytome avec 100 % de spécificité)

Examens complémentaires

- Recueil sur les urines de 24 h de la métanéphrine (élevée)
- Test de frénation à la clonidine

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- Échographie obstétricale

Examens complémentaires

- IRM (a été utilisée pour détecter le placenta prævia ; toutefois, l'échographie reste la méthode de diagnostic préférable)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Figure 34 Classification des placenta prævia. (D'après Symonds EM, Symonds IM : Essential Obstetrics and Gynecology, ed 4, Édinburgh, Churchill Livingstone, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Artériographie abdominale (qui révèle des anévrysmes petits ou grands et resserrements artériels par endroits entre des segments dilatés ; se voient sur les artères rénales, mésentériques ou hépatiques)

Examens complémentaires

- TDM ou échographie abdominales pour éliminer d'autres causes

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie de petites ou moyennes artères (une biopsie du muscle gastrocnémien ou du nerf sural est couramment pratiquée)

Examens complémentaires

- NFS, VS
- Ag HBs, AAN
- Transaminases, azotémie, créatininémie
- pANCA

Algorithme diagnostique

Figure 35 Anévrysmes de l'artère mésentérique dans une polyarthrite. (D'après Hochberg MC, Silma AJ, Smolten JS, Weinblatt ME, Weisman MH, eds : Rheumatology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2003.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste pour exclure un cancer des reins ou du foie ou une maladie polykystique des reins et pour évaluer la splénomégalie

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Taux d'EPO (bas)
- Recherche de la mutation JAK2 V617

Examens complémentaires

- Leucocytes, phosphatase alcaline (augmentée), uricémie (augmentée), B_{12} (augmentée)
- Saturation en O_2
- La P50 sanguine (courbe d'oxygène dissociée)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- Échographie de l'abdomen si cirrhose ou néphropathie suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- TSH

Examens complémentaires

- Glycémie à jeun, azotémie, créatininémie, transaminases
- ECBU
- Taux de déhydroépiandrostérone sérique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'hypophyse avec injection de gadolinium

Examens complémentaires

- TDM de l'hypophyse si l'IRM est contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Taux de prolactinémie

Examens complémentaires

- Stimulation de la TRH (utile dans les cas douteux) ; la réponse normale est une augmentation de 100 % de la prolactinémie moins d'une heure après l'injection ; l'absence d'augmentation suggère une lésion hypophysaire

Algorithme diagnostique

Figure 36 IRM sagittale montrant un gros prolactinome hypophysaire chez une jeune fille âgée de 13 ans ayant des maux de tête et une galactorrhée. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie rénale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Recueil de la protéinurie sur urines de 24 h

Examens complémentaires

- Glycémie, azotémie, créatinémie
- Immunoelectrophorèse des protéines urinaires
- AAN, C3 et C4
- c-ANCA, p-ANCA
- Ac antimembrane basale glomérulaire (ABG)
- Ag HBs, VHC, VIH
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- TDM abdominale et thoracique avec injection IV de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS

Examens complémentaires

- VS (non spécifique)
- Glycémie, azotémie, créatinémie
- Transaminases, phosphatase alcaline, bilirubinémie
- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM hypophysaire avec injection de gadolinium

Examens complémentaires

- TDM de l'hypophyse si l'IRM est contre-indiquée
- IRM ou TDM des surrénales (pour exclure un cancer)
- Échographie testiculaire chez un patient ayant un gonflement unilatéral d'un testicule

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- LH, FSH
- GnRH

Examens complémentaires

- β -HCG
- Testostéronémie (hommes)
- TSH
- DHEAS, D4 androstènedione
- Test de freination à la dexamétasone

Algorithme diagnostique

Tableau 2 Protocole d'investigations d'une puberté précoce

Anamnèse, histoire familiale Exposition aux stéroïdes	
Examen clinique	Lésions cutanées, par ex. neurofibromatose, syndrome de McCune-Albright, examen neurologique
Étude de la croissance	Stades pubertaires (Tanner) Hauteur, poids, rapidité de croissance Âge osseux
Bilan hormonal	Testostérone/estradiol Lutéine/hormone stimulant les follicules Androgènes surréniaux (DHEAS) 17-hydroxyprogesterone + stimulation par ACTH Dosage des β -HCG Test hormonal gonadotrophine
Imagerie	Échographie pelvienne IRM de la région hypothalamo-hypophysaire
Analyse ADN à la recherche de troubles génétiques (atteinte testiculaire, syndrome de McCune-Albright)	

DHEAS : sulfate de déhydroépiandrostérone

(D'après Besser CM, Thorner MO : Comprehensive Clinical Endocrinology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2002.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- IRM de l'hypophyse avec injection de gadolinium
- Échographie pelvienne (femmes)
- Âge osseux (radiographie de la main et du poignet)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- FSH, LH

Examens complémentaires

- Prolactinémie
- Testostéronémie libre
- GnRH
- Caryotype

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique quand une pathologie vasculaire du collagène ou une granulomatose de Wegener sont suspectées
- Échocardiogramme quand une endocardite est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Numération plaquettaire

Examens complémentaires

- NFS, frottis sanguin, TP, TCA
- AAN (pour exclure vascularite, maladie du collagène)
- Transaminases, créatinémie
- Cryoglobulines (pour exclure une cryoglobulinémie), Immunoélectrophorèse (pour exclure une hyperglobulinémie)
- Hémocultures × 2 (pour exclure une endocardite)
- c-ANCA (pour exclure une maladie de Wegener)
- p-ANCA (pour exclure une vascularite)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- CPK fractionnée

Examens complémentaires

- Azotémie, créatininémie, ionogramme, calcémie, phosphatémie, transaminases, uricémie
- NFS
- ECBU
- Taux de myoglobine sanguine et urinaire

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'épaule sans injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- L'échographie de l'extrémité supérieure peut être utile au diagnostic quand une rupture du supraépineux est suspectée. Une faiblesse majeure dans l'évaluation du blocage de l'épaule est liée à l'incapacité de visualiser complètement le bourrelet ; la précision est dépendante de l'habileté de l'opérateur
- Arthrographie par IRM (utile dans l'instabilité de l'épaule pour diagnostiquer des ruptures de la coiffe)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Figure 37 IRM d'une atteinte de la coiffe des rotateurs. L'image montre une rupture partielle le long de la coiffe des rotateurs avec une atteinte laminaire et un petit kyste dans la partie distale du tendon supraépineux. (Source : Hochberg MC, Silma AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, eds : Rheumatology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2003.)

Figure 38 Rupture de la coiffe des rotateurs. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM du sein sans injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Une échographie du sein est pratiquée si l'IRM est contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Figure 39 Rupture de prothèse mammaire. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie thoracique

Examens complémentaires

- TDM thoracique (révélant souvent des adénopathies hilaires et paratrachéales)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie d'organes atteints par la sarcôïdose (par ex. ganglion lymphatique, peau, conjonctive)

Examens complémentaires

- NFS, VS
- Transaminases, calcémie
- ACE
- EFR

Algorithme diagnostique

Figure 40 Calcifications en coquille d'œuf dans une sarcôïdose. Il y a une vaste calcification au niveau du hile et des ganglions lymphatiques médiastinaux ; la calcification a une disposition périphérique en coquille d'œufs, particulièrement dans les ganglions lymphatiques sur la partie droite du hile. L'implication cardiaque nécessite la pose d'un stimulateur. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Figure 41 Scintigraphie au gallium anormale d'une sarcoïdose. Elle montre une hyperfixation des glandes lacrymales, parotides et salivaires (signe du panda) ainsi que des ganglions lymphatiques médiastinaux (signe du lambda) et des poumons. (Source : Hochberg MC, Silma AJ, Smolens JS, Weimblatt ME, Weisman MH, eds : Rheumatology, ed 3, St. Louis, Mosby, 2003.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM cérébrale avec injection de gadolinium

Examens complémentaires

- IRM du rachis avec injection de gadolinium dans des cas sélectionnés

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- PL avec analyse du LCR

Examens complémentaires

- Électrophorèse sur agarose du LCR (révèle une discrète bande « monoclonale » dans la zone gamma dans environ 90 % des cas)
- Protéïnorachie augmentée, mononucléaires, gammaglobuline (surtout IgG)
- Présence de protéines myéliniques dans le LCR

Algorithme diagnostique

Figure 42 Résultats d'une IRM dans une sclérose en plaques. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghani MG, Chen JW : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique
- IRM du cerveau et de la moelle épinière
- Transit baryté pour évaluer le risque de fausse route

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Ponction lombaire et analyse du LCR
- Dosage de B₁₂, TSH, VIH et plombémie
- Immunoélectrophorèse des protéines
- Biopsie musculaire pour éliminer une myopathie chez des patients sélectionnés

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM avec coupes coronales sans produit de contraste (réservée généralement aux sinusites compliquées ou pour préciser l'anatomie avant l'intervention chirurgicale)

Examens complémentaires

- Radiographie des sinus (peu employée pour le diagnostic)
- IRM des sinus (ne définit pas aussi bien l'anatomie que la TDM mais peut servir à différencier les structures tissulaires ; par ex. cancer, mycose)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aspiration des sinus et cultures

Examens complémentaires

- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- TDM abdominale

Examens complémentaires

- Échographie abdominale si la TDM est contre-indiquée
- Échocardiographie si insuffisance cardiaque ou endocardite sont suspectées

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS

Examens complémentaires

- Virémie d'EBV, CMV
- Transaminases, bilirubinémie, albuminémie, INR
- VS, facteurs rhumatoïdes, AAN
- Hémocultures × 2 si abcès splénique suspecté

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- ARM des artères rénales

Examens complémentaires

- Échographie rénale
- Scintigraphie rénale au Captopril si la chirurgie est envisagée
- Angiographie (pour le diagnostic et aussi utilisée pendant l'intervention [angioplastie, pose d'un stent])

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage sélectif de la rénine dans la veine rénale (gold standard mais invasif et coûteux)

Examens complémentaires

- Créatininémie, azotémie, ionogramme
- ECBU

Algorithme diagnostique

192. Sténose du canal rachidien

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM rachidienne (sensibilité 80–90 %, spécificité 95 %)

Examens complémentaires

- TDM rachidienne (sensibilité 75–85 %, spécificité 80 %), si IRM contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- IRM de l'hypophyse avec injection de produit de contraste
- Hystérosalpingographie
- Échographie des testicules

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Analyse du liquide sémal
- Biopsie de l'endomètre chez la femme

Examens complémentaires

- FSH, LH
- Prolactinémie
- Testostéronémie (homme)
- TSH
- NFS, VS, glycémie
- ECBU, VDRL, culture *Mycoplasma*, sérologie *Chlamydiae*

Algorithme diagnostique

Figure 43 **A.** L'hystérosalpingographie permet d'estimer la zone de l'obstruction tubaire et la présence d'une anomalie dans la cavité utérine. **B.** On peut voir le contour externe triangulaire de la cavité utérine et l'écoulement des deux côtés des franges ovariennes des trompes de Fallope. (Source : Symonds EM, Symonds IM : *Essentiel Obstetrics and Gynecology*, ed 4, Édimbourg, Churchill Livingstone, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complmentaires

- TDM ou IRM cphalique avec injection de produit de contraste
- TDM de l'os temporal sans injection de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complmentaires

- NFS
- Transaminases
- AAN, VDRL
- TSH

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun, l'anamnèse et l'examen clinique doivent orienter l'imagerie diagnostique

Examens complémentaires

- Échocardiographie cardiaque (utile chez les patients ayant un souffle cardiaque pour exclure sténose aortique, cardiomyopathie hypertrophique ou myxome
- de l'oreillette)
- TDM cérébrale et EEG si épilepsie suspectée
- TDM spiralée thoracique ou scintigraphie de ventilation et perfusion si embolie pulmonaire suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Bilan hématologique de routine (rarement utile au diagnostic et devrait être effectué uniquement en fonction de l'anamnèse et de l'examen clinique)
- Test de grossesse (chez femme en âge de procréer)
- NFS, ionogramme, azotémie, créatininémie
- Calcémie, magnésémie
- Gaz du sang
- ECG
- Troponines (si notion de douleur thoracique avant la syncope)
- Bilan toxicologique suivant les patients
- Test d'effort cardiaque
- Cathétérisme cardiaque

Algorithme diagnostique

Figure 44 Un test d'inclinaison à 70° sur table motorisée avec appui-pieds. Ne sont pas représentés les électrodes ECG pour le monitoring ni le brassard pour la prise de tension en continu. (D'après Crawford MH, DiMarco JP, Paulus WJ, eds : Cardiology, ed 2, St Louis, Mosby, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM de l'abdomen, du pelvis et du thorax avec produit de contraste oral et IV pour localiser la tumeur et repérer les métastases

Examens complémentaires

- Échocardiogramme cœur ou IRM si suspicion de tumeur carcinoïde cardiaque
- Scanner à l'iode 133

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Urines des 24 h pour doser la 5-HIAA

Examens complémentaires

- Transaminases
- Électrophorèse, azotémie, créatininémie
- Phosphatase alcaline

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- Aucun

Examens complémentaires

- IRM ou TDM du cerveau en cas d'encéphalopathie ou de complications locales du SNC
- Scintigraphie pulmonaire au gallium en cas de suspicion de *Pneumocystis pneumoniae*

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Test ELISA : détection dans le sang des patients des anticorps dirigés contre le VIH, confirmé par un Western blot si positif

Examens complémentaires

- La quantification par PCR de l'ARN viral plasmatique est le test permettant de suivre l'intensité de la réplication virale dans l'organisme infecté et il est appelé charge virale
- Ce test, couplé à la mesure du taux de lymphocytes T CD4+, est utilisé pour suivre l'évolution virologique d'un patient avant ou après la mise sous traitement

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler de l'abdomen

Examens complémentaires

- IRM ou TDM avec injection IV de produit de contraste (peut montrer une circulation collatérale et une visualisation médiocre) des veines hépatiques)
- Scintigraphie au TC-99SC (pouvant montrer le thrombus veineux au niveau du lobe caudal)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Transaminases, phosphatase alcaline
- Bilirubinémie, plaquettes
- Tests virologiques hépatites
- AAN, taux d' α_1 -antitrypsine, de céruloplasmine, Ac antimuscles lisses, Ac antimitochondries
- Bilan toxicologique

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM ou TDM des glandes surrénales avec produit de contraste en cas de suspicion de syndrome de Cushing surrénalien
- IRM cérébrale au gadolinium en cas de suspicion de Cushing hypophysaire

Examens complémentaires

- TDM du thorax pour les patients ayant un syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH (pour éliminer ou non un cancer des poumons, des reins ou du pancréas)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Test nocturne de freination à la dexaméthasone
- Cortisol plasmatique

Examens complémentaires

- Ionogramme, créatininémie, glycémie à jeun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Radiographie pulmonaire

Examens complémentaires

- TDM si suspicion de lymphangite carcinomateuse

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Gaz du sang

Examens complémentaires

- NFS
- Cytobactériologie, cultures sang et urines
- Lavage bronchoalvéolaire (patients sélectionnés qui répondent peu au traitement)

Algorithme diagnostique

Figure 45 SDRA dû à une maladie extrapulmonaire. Radiographie thoracique 2 jours ½ après une hémorragie postopératoire. Il y a une opacification en verre dépoli, un peu plus grande à droite qu'à gauche. Pour des raisons inconnues, le sommet gauche de l'apex est épargné. On peut noter incidemment des signes de barotraumatisme (pneumomédiastin et air sous-cutané au niveau du cou). (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM de l'ATM sans contraste

Examens complémentaires

- TDM de l'ATM sans contraste (si l'IRM est contre-indiquée ; utile pour diagnostiquer l'atteinte osseuse ou méniscale de l'ATM)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Phlébographie de la veine cave supérieure

Examens complémentaires

- TDM thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Biopsie de la tumeur médiastinale (par ex. lymphome, cancer pulmonaire) comprimant la veine cave supérieure

Algorithme diagnostique

Figure 46 Phlébographie du membre supérieur. Cette phlébographie des deux bras révèle l'obstruction de la VCS par une tumeur du médiastin (*flèche*). Il s'agit d'un syndrome de la VCS provoqué par métastase d'un cancer pulmonaire. Notez les vaisseaux collatéraux dilatés (*pointe de flèche*). (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (pour éliminer cancer ou processus infectieux)
- IRM cérébrale pour éliminer une lésion du SNC

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme, osmolarité
- Sodium urinaire, osmolarité urinaire
- Azotémie, créatininémie

Examens complémentaires

- Uricémie (diminuée)
- TSH
- Cortisolémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM ou IRM de l'abdomen avec produit de contraste
- Artériographie sélective de l'artère cœliaque à la recherche d'un gastrinome
- Un scanner à l'octréotide radioactif peut être employé pour la localisation

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage de la gastrine sérique > 150 pg/ml

Examens complémentaires

- Test d'augmentation du taux de gastrine (par stimulation à la sécrétine ou au calcium)
- Transaminases

Algorithme diagnostique

205. Syndrome des anticorps antiphospholipides

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde
- IRM ou TDM du cerveau si symptômes neurologiques

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Test ELISA des Ac anticardiolipines
- Anticoagulant lupique

Examens complémentaires

- AAN
- TP, TCA, INR, fibrinogène
- NFS, VDRL
- Protéines C et S, antithrombine III, facteur V de Leiden, facteur VIII,
- facteur XI, taux d'homocystéine

Algorithme diagnostique

206. Syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie du membre concerné (pour exclure une autre origine de la symptomatologie)
- Scintigraphie osseuse

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS, VS
- AAN
- Glycémie

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Artériographie ou veinographie quand la pathologie vasculaire est suspectée cliniquement

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique (pour exclure une côte cervicale)
- Radiographie de la colonne cervicale (pour exclure une atteinte d'un disque cervical)
- TDM thoracique (pour éliminer un cancer du poumon)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- EMG, examen de la conduction nerveuse

Algorithme diagnostique

Imagerie

- Examen(s) pertinent(s)
- Artériographie de la sous-clavière et des artères vertébrales innominées

Examens complémentaires

- Écho-Doppler des artères vertébrales, innominées et sous-clavière (meilleur test de dépistage)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Bilan lipidique
- Glycémie à jeun
- VS, AAN

Algorithme diagnostique

Figure 47 Syndrome du vol de la sous-clavière : angiographie de l'arc aortique. **A.** Projection antéro-oblique gauche, phase artérielle : obstruction proximale de l'artère sous-clavière gauche (flèche). Notez l'irrégularité et la tortuosité de l'artère vertébrale droite due à la dégradation des vertèbres cervicales (petite flèche). **B.** Projection antéro-oblique droite en dernière phase de l'angiographie ; le segment distal de l'artère sous-clavière gauche (flèche) se remplit via le flot rétrograde dans l'artère vertébrale gauche, bien que ce vaisseau soit presque complètement obstrué à son origine (petite flèche). (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Échographie rénale pour exclure une obstruction

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Calcul de l'excrétion fractionnée du sodium (EF_{Na}) = $[U/P \text{ sodium} / U/P \text{ créatinine}] \times 100$

Examens complémentaires

- Ionogramme, créatinine, azotémie, osmolarité sérique
- Natriurie, osmolarité et créatinine urinaires

Algorithme diagnostique **Tableau 3** Critères diagnostiques d'un syndrome hépatorénal**Critères essentiels**

- Atteinte hépatique chronique ou aiguë avec défaillance hépatique avancée et hypertension portale
- Taux de filtration glomérulaire bas, indiqué par une créatininémie $> 1,5$ mg/dl ($135 \mu\text{mol/l}$) ou une clairance de la créatinine < 40 ml/min
- Absence de choc, d'infection bactérienne en cours, et un traitement actuel ou récent avec des médicaments néphrotoxiques
- Absence de pertes de liquides gastro-intestinaux (vomissements répétés ou diarrhée intense)
- Absence de pertes rénales (perte de poids > 500 g/jour pendant plusieurs jours chez des patients ayant une ascite sans œdème périphérique ou 1000 g/jour chez des patients ayant un œdème périphérique)
- Pas d'amélioration prolongée de la fonction rénale (diminution de la créatininémie à $1,5$ mg/dl [$135 \mu\text{mol/l}$] ou moins, ou augmentation de la clairance de la créatinine à 40 ml/min ou plus) après arrêt de diurétique et augmentation du volume plasmatique avec $1,5$ l de solution salée isotonique
- Protéinurie < 500 mg/jour et pas d'obstruction urinaire ou de maladie du parenchyme rénal évidentes à l'échographie

Critères annexes

- Excrétion urinaire < 500 ml/jour
- Natriurie < 10 mmol/l
- Osmolarité urinaire plus grande que l'osmolarité plasmatique
- Nombre de cellules rouges urinaires < 50 par champ à grande puissance
- Concentration de la natrémie < 130 mmol/l

D'après Johnson RJ, Feehally J : Comprehensive Clinical Nephrology, ed 2, St. Louis, Mosby, 2000.

Aide au diagnostic en médecine générale

© 2012, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Échographie du foie

Examens complémentaires

- TDM du foie si l'échographie n'est pas concluante

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Biopsie hépatique

Examens complémentaires

- Transaminases, phosphatase alcaline
- Bilirubine
- γ -GT
- Bilan hépatique
- Albuminémie, TP
- AAN, saturation de la transferrine
- Immunoelectrophorèse des protéines
- Taux de céruloplasmine
- Cuivre sérique, Ac antimuscle lisse, Ac LKM-1

Algorithme diagnostique

211. Thrombocytopénie

Imagerie

Examen(s) pertinent(s)

- Aucun

Examens complémentaires

- TDM abdominale s'il existe une splénomégalie

Examens de laboratoire

Examen(s) pertinent(s)

- Frottis de moelle osseuse

Examens complémentaires

- NFS, TP, TCA
- LDH
- VIH, AAN
- Ac antiplaquettaire
- D-dimères
- Test de Coombs

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique et abdominale

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Myélogramme

Examens complémentaires

- NFS
- Taux de réticulocytes
- Trois analyses de selles à la recherche de saignement occulte
- Fer sérique, ferritinémie, sidérophiline

Algorithme diagnostique

213. Thrombose de la veine mésentérique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM abdominale avec injection de produit de contraste (peut révéler une paroi intestinale épaissie, une dilatation veineuse, une thrombose veineuse)

Examens complémentaires

- Angiographie si TDM douteuse
- Radiographie standard de l'abdomen (en général non spécifique)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- NFS
- Ionogramme (une acidose métabolique est indicative d'un possible infarctus mésentérique)

Examens complémentaires

- Amylasémie
- Bilan de la coagulation (par ex. TP, TCA, plaquettes, protéines C, S, antithrombine III)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler de la veine porte

Examens complémentaires

- IRM de la veine porte si l'Écho-Doppler est douteux
- TDM avec injection IV de produit de contraste (pour exclure un cancer)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Bilan de la coagulation (TP, TCA, facteur V de Leiden, protéines C et S, antithrombine III, anticoagulant lupique)
- Transaminases, créatinémie, analyse d'urine
- AAN

Algorithme diagnostique

Figure 48 Thrombose de la veine porte. Une thrombose partielle de la veine porte (*portal vn*) est visible en mode B en reflet échographique sur le côté de la veine (*flèches*). Un examen Doppler est nécessaire pour vérifier la perméabilité car certains thrombus sont hypoéchogènes et peuvent ne pas être visibles en mode B. *H. artery* : artère hépatique. (Source : Grainger RG, Allison DJ, Adam A, Dixon AK, eds : Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, ed 4, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Phlébographie rénale

Examens complémentaires

- Écho-Doppler de l'abdomen (souvent la recherche initiale)
- IRM abdominale
- TDM abdominale avec injection de produit de contraste

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- ECBU
- Bilan de la coagulation (TP, TCA, facteur V de Leiden, plaquettes, antithrombine III, protéines C et S, anticoagulant lupique)
- Ionogramme, azotémie, créatininémie, transaminases, glycémie

Algorithme diagnostique

Figure 49 Thrombose de la veine rénale. TDM montrant la thrombose de la veine rénale gauche.

(Remerciement au Dr S. Rankin. Source : Johnson RJ, Feehally J : Comprehensive Clinical Nephrology, ed 2, St. Louis, Mosby, 2000.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM du sinus caverneux avec veinographie par résonance magnétique (VRM)

Examens complémentaires

- TDM des sinus qui peut être utilisée pour différencier une sinusite sphénoïdale d'une thrombose du sinus caverneux et peut aussi révéler l'origine de la thrombose

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- VS (non spécifique)
- Hémocultures × 2
- Cytobactériologie, culture du liquide sinusal
- PL pour exclure une méningite

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler duplex du membre atteint

Examens complémentaires

- Phlébographie « gold standard » mais invasive et douloureuse
- Phlébographie par résonance magnétique avec visualisation direct des thrombus (PIRMV) ; très précise et non invasive mais limitée par le coup et la faisabilité

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Dosage des D-dimères par ELISA

Examens complémentaires

- TP, TCA, nombre de plaquettes
- Bilan de la coagulation (par ex. protéines C, S, antithrombine III, facteur V Leiden, anticoagulant lupique) chez les patients suspectés de troubles de la coagulation)

Algorithme diagnostique

Tableau 4 Estimation clinique de Well pour le prétest de probabilité de thrombose veineuse profonde (TVP)

	Score
Cancer actif (traitement en cours ou débuté depuis moins de 6 mois ou palliatif)	1
Paralysie, parésie ou récente immobilisation plâtrée des membres inférieurs	1
Alitement récent > 3 jours ou chirurgie majeure depuis moins de 4 semaines	1
Sensibilité localisée le long du système veineux profond	1
Gonflement de toute la jambe	1
Gonflement du mollet > 3 cm du côté asymptomatique (mesuré 10 cm sous la tubérosité tibiale)	1
Œdème prenant le godet uniquement sur la jambe atteinte	1
Veines superficielles collatérales (sans varicosités)	1
Diagnostic alternatif plus probable ou plus important que celui de TVP	-2

Chez les patients atteints des deux côtés, la jambe la plus symptomatique est utilisée. Le calcul du prétest donne un score : élevé > 3 ; moyen 1 ou 2 ; faible < 0.

(D'après Crawford MH, DiMarco JP, Paulus WJ, eds : Cardiology, ed 2, St. Louis, Mosby, 2004.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Scintigraphie à l'iode radioactif (utilisé pour distinguer la maladie de Basedow (taux augmenté) d'une thyroïdite (taux normal ou bas))

Examens complémentaires

- Échographie thyroïdienne

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- TSH, T_4 libre
- NFS (pouvant montrer une augmentation des leucocytes dans les thyroïdites subaiguës ou suppuratives)
- Anticorps antimicrosomiaux (chez plus de 90 % des patients atteints de thyroïdite de Hashimoto)
- Le taux de thyroglobuline est augmenté dans la thyroïdite lymphocytaire auto-immune

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Écho-Doppler scrotal (Doppler fluorimétrique)

Examens complémentaires

- Scintigraphie scrotale au Tc-99m également pour vérifier la circulation sanguine testiculaire (son absence confirme la torsion)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Figure 50 Torsion du testicule. Évaluation du flux sanguin dans le testicule après injection d'un bolus intraveineux de produit radioactif. Les vaisseaux iliaques droit et gauche sont clairement identifiés et les images sont obtenues toutes les 3 s. Ici, on aperçoit l'augmentation du flux sur le pourtour du testicule gauche (flèches) et pas de flux sanguin central. C'est l'aspect d'une torsion depuis approximativement moins de 24 h. (Source : Mettler FA, Guibertau MJ, Voss CM, Urbina CE : Primary Care Radiology, Philadelphie, WB Saunders, 2000.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM ou IRM du cou

Examens complémentaires

- Échographie thyroïdienne
- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- TSH
- Calcémie
- MNI test
- Cytobactériologie, culture et antibiogramme du prélèvement de gorge

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie du foie

Examens complémentaires

- TDM du foie
- IRM du foie

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Transaminases, phosphatase alcaline
- NFS
- TP (INR)
- Bilan hépatique
- Taux d' α -foetoprotéine

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM haute résolution du pancréas avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- CPRE
- Échographie endoscopique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie à l'aiguille guidée par échographie

Examens complémentaires

- Amylasémie, lipasémie, phosphatase alcaline, transaminases
- Calcémie

Algorithme diagnostique

Nécrose centrale au sein d'un dépôt hypervascularisé

Figure 51 Métastases hépatiques d'une tumeur carcinoïde primitive pancréatique : vues TDM. **A.** La TDM à la séquence 25 s de l'injection du produit de contraste IV (phase « artérielle ») montre des métastases typiquement hypervascularisées d'un cancer du foie. On aperçoit la nécrose centrale au sein de la grosse lésion du lobe droit du foie.

Tumeur primitive dans
la queue du pancréas

Figure 51 (suite) B. La TDM à la séquences 75 s de l'injection du produit de contraste IV (phase « veine porte ») montre que les lésions vasculaires sont devenues isodenses avec le parenchyme hépatique normal. La tumeur primitive dans la queue du pancréas est aussi clairement visible. Comme représenté ici, les métastases d'une tumeur carcinoïde hépatique sont typiquement hypervascularisées et sont visualisées au mieux pendant la phase artérielle de la TDM ou de l'IRM avec produit de contraste, car elles sont de même densité quand on les compare avec le parenchyme hépatique adjacent pendant la phase de la veine porte du rehaussement. (Source : Besser CM, Thormer MO : *Comprehensive Clinical Endocrinology*, ed 3, St Louis, Mosby, 2002.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Mammographie
- Échographie

Examens complémentaires

- IRM si cas particuliers (par ex. implants mammaires)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Ponction cytologique d'un kyste

Algorithme diagnostique

224. Tumeur intracrânienne

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM cérébrale avec injection IV de produit de contraste

Examens complémentaires

- TDM cérébrale avec injection IV de produit de contraste ; la TDM sans contraste n'est pas utilisée, sauf pour le bilan des érosions et calcifications osseuses

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Aucun

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- L'échographie pelvienne est le meilleur examen initial

Examens complémentaires

- TDM du pelvis avec injection IV du produit de contraste
- IRM du pelvis

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Biopsie de la tumeur pelvienne

Examens complémentaires

- CA 125
- NFS, créatinémie
- β -HCG sériques

1.1 Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- TDM des reins avec et sans injection de produit de contraste

Examens complémentaires

- Échographie si kyste
- IRM rénale quand une thrombose de la veine rénale ou de la veine cave inférieure est suspectée ou quand la TDM est contre-indiquée
- Urographie IV (son rôle dans l'évaluation d'une tumeur rénale est discutable : manque de sensibilité et de spécificité, forte irradiation)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Analyse d'urine

Examens complémentaires

- Créatininémie, calcémie, albuminémie
- VS (non spécifique)
- NFS

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Échographie du scrotum

Examens complémentaires

- IRM pelvienne avec et sans produit de contraste pour mettre en évidence un cancer

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Analyse d'urine
- NFS
- α -fœtoprotéïnémie
- β -HCG

Algorithme diagnostique

Figure 52 Tumeur scrotale. (D'après Weissleder R, Wittenberg J, Harisinghini MG, Chen JW, eds : Primer of Diagnostic Imaging, ed 4, St. Louis, Mosby, 2007.)

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM des glandes surrénales avec produit de contraste

Examens complémentaires

- TDM des surrénales avec ou sans injection de produit de contraste si IRM contre-indiquée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Ionogramme

Examens complémentaires

- Si symptômes de phéochromocytome, doser le taux de métanéphrine plasmatique et recueillir sur urines de 24 h les métanéphrines
- Si faciès cushingoïde, faire un test de frénation nocturne de la dexaméthasone
- Si signes de virilisation ou de féminisation, doser sur urines de 24 h les 17-cétostéroïdes et la DHEAS plasmatique
- Si une hypertension est présente avec hypokaliémie, vérifier qu'il ne s'agit pas d'un hyperaldostérionisme

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Transit gastroduodénal si le patient refuse la fibroscopie
- Échographie abdominale si l'on suspecte une lithiase biliaire ou une cholécystite
- TDM si une lésion pancréatique est suspectée

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Test antigénique sur les selles à la recherche d'*H. pylori* ou test respiratoire à l'urée
- NFS
- Amylasémie si douleur abdominale aiguë

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- Radiographie thoracique

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- AAN
- Bilan hépatique
- Transaminases, MNI-test
- Anticorps antithyroïdiens
- Coproculture (œufs et parasites)

Algorithme diagnostique

Imagerie**Examen(s) pertinent(s)**

- IRM cérébrale

Examens complémentaires

- ARM de la circulation postérieure (TDM de la région pontocérébelleuse si IRM contre-indiquée)

Examens de laboratoire**Examen(s) pertinent(s)**

- Aucun

Examens complémentaires

- NFS
- Glycémie, créatininémie, transaminases, ionogramme

Algorithme diagnostique

1. Abeloff MD. Clinical Oncology. Ed 2. New York: Churchill Livingstone; 2000.
2. Andreoli TE, ed. Cecil Essentials of Medicine. Philadelphia: WB Saunders; 1997.
3. Carlson KJ, et al. Primary Care of Women. Ed 2. St. Louis: Mosby; 2002.
4. Feldman M, et al. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Diseases: Pathophysiology/Diagnosis/Management. Ed 6. Philadelphia: WB Saunders; 1998.
5. Gay SB, Woodcock RJ. Radiology Recall. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
6. Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Textbook of Medicine. Ed 22. Philadelphia: WB Saunders; 2004.
7. Greene HL, Johnson WP, Lemcke D, eds. Decision Making in Medicine. Ed 2. St. Louis: Mosby; 1998.
8. Healey PM. Common Medical Diagnosis: An Algorithmic Approach. Ed 3. Philadelphia: WB Saunders; 2000.
9. Henry JB, ed. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. Ed 20. Philadelphia: WB Saunders; 2001.
10. Kassirer J, ed. Current Therapy in Adult Medicine. Ed 4. St. Louis: Mosby; 1998.
11. Marx JA, ed. Rosen's Emergency Medicine. St. Louis: Mosby; 2002.
12. Mettler FA, et al. Primary Care Radiology. Philadelphia: WB Saunders; 2000.
13. Moore WT, Eastman RC. Diagnostic Endocrinology. Ed 2. St. Louis: Mosby; 1996.
14. Noble J. Primary Care Medicine. Ed 3. St. Louis: Mosby; 2001.
15. Nseyo UO, ed. Urology for Primary Care Physicians. Philadelphia: WB Saunders; 1999.
16. Orrison WW, et al. Pocket Medical Imaging Consultant. Houston: HealthHelp; 2002.
17. Rakel RE, ed. Principles of Family Practice. Ed 6. Philadelphia: WB Saunders; 2002.
18. Stein JH, ed. Internal Medicine. Ed 5. St. Louis: Mosby; 1998.